 <p>HOSPITAL COMARCAL de l'Alt Penedès CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDÈS</p>	El/la pacient	
	DNI	HC núm.
	Servei de Digestiu	
	Metge/essa	
	Núm. de col·legiat/ada	
DECLARO que		

Tractament amb Adalimumab. Consentiment Informat

M'ha explicat que, en la meua situació, és necessari i/o convenient realitzar un tractament amb Adalimumab.

1. Informació general

L'Adalimumab és un fàrmac que actua disminuint els nivells de TNF α i ha demostrat ser eficaç en el tractament de les persones que pateixen una malaltia inflamatòria intestinal: malaltia de Crohn i colitis ulcerosa, quan no responen de forma adequada, al tractament amb altres fàrmacs.

Actualment sabem que la substància anomenada TNF és una de les principals responsables del dolor i de la inflamació en las malalties inflamatòries intestinals.

2. Descripció del procediment

El tractament es realitza per injecció subcutània.

Aquest tractament es realitza de forma continuada, mentre el fàrmac mantingui la seva eficàcia i l'activitat de la malaltia ho requereixi.

3. Preparació

Abans d'iniciar el tractament es realitza un estudi al pacient, per a detectar-li infeccions actives.

4. Beneficis esperats

Alleujar els símptomes i frenar la progressió de la malaltia inflamatòria intestinal.


5. Riscos específics més freqüents d'aquest procediment (es recomana llegir el prospecte del medicament per a una major i més detallada informació).

Durant el tractament amb aquest fàrmac, el pacient pot patir infeccions amb més facilitat. Alguns pacients han desenvolupat infeccions lleus, com un refredat comú, però en d'altres pacients s'han desenvolupat algunes infeccions més greu com: la pneumònia, la tuberculosi o d'altres infeccions. Per a evitar això, abans d'iniciar el tractament es realitza, a tots els pacients: la prova de la tuberculina, a la pell, i una radiografia de tòrax, per tal de descartar un contacte previ amb el bacteri que produeix la tuberculosi.

Si les proves prèvies són positives afegirem un tractament per prevenir la tuberculosi, a més del tractament amb Adalimumab.

El Adalimumab afecta el sistema immunològic ("les defenses") del nadó, per aquesta raó, si vostè és una dona en edat de tenir fills, mentre segueixi el tractament amb Adalimumab i durant els 6 mesos posteriors a l'última administració, no pot quedar-se embarassada i ha d'utilitzar un mètode anticonceptiu segur.

El pacient ha de posar-se en contacte amb el seu Digestòleg o amb un Servei Mèdic si li cal una vacunació, si presenta algun efecte secundari greu o si té algun signe d'infecció (febren, malestar general, etc.).

 <p>HOSPITAL COMARCAL de l'Alt Penedès CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDÈS</p>	El/la pacient DNI _____ HC núm. _____ Servei de Digestiu Metge/essa Núm. de col·legiat/ada _____ DECLARO que
---	--

He comprès les explicacions que m'han facilitat, en un llenguatge clar i senzill. El professional que m'ha atès, m'ha permès realitzar totes les observacions i **m'ha aclarit** tots els dubtes que li he plantejat.

Per tant, declaro que estic satisfet/a amb la informació rebuda i comprenc l'abast i els riscos del tractament proposat.

I en aquestes condicions,

AUTORIZO: Que em sigui realitzat un tractament amb Adalimumab.

NO AUTORIZO: Que em sigui realitzat un tractament amb Adalimumab.

Signatura del/de la pacient i DNI

Representant legal i DNI

Signatura del/de la professional i
núm. de col·legiat/ada

Vilafranca del Penedès, _____ / _____ / _____