 <p>HOSPITAL COMARCAL de l'Alt Penedès CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDÈS</p>	El/la pacient	
	DNI	HC núm.
	Servei de Digestiu	
	Metge/essa	
	Núm. de col·legiat/ada	
DECLARO que		

Tractament amb Infliximab. Consentiment Informat

M'ha explicat que, en la meua situació, és necessari i/o convenient realitzar un tractament amb Infliximab.

1. Informació general

El Infliximab és un fàrmac que actua disminuint els nivells de TNF i ha demostrat ser eficaç en el tractament de les malalties inflamatòries intestinals: Malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa, quan aquestes no responen de forma adequada al tractament amb altres fàrmacs. Actualment, es coneix que la TNF és una de les principals substàncies responsables del dolor i de la inflamació.

2. Descripció del procediment

El tractament se li administra per via intravenosa a l'Hospital de Dia. La administració de cada dosi dura, aproximadament, 2 hores.

S'administra la primera dosi, la segona dosi s'administra a les dues setmanes, la tercera dosi a les sis setmanes, des del començament del tractament i posteriorment cada 8 setmanes. En alguns casos es necessari augmentar la freqüència en l'administració de les dosis.

3. Preparació

Abans de començar el tractament es fa una avaluació del pacient que consisteix en: història mèdica complerta, exploració física, analítica general de sang, prova de la tuberculina i radiografia de tòrax.

4. Beneficis esperats

Alleujar els símptomes i frenar el progrés de la malaltia.


5. Riscos específics més freqüents d'aquest procediment

Riscos generals:

Durant o després de l'administració del fàrmac es pot presentar: mal de cap, nàusees, alteracions de la pressió arterial, picor, febre, sufocacions, erupcions a la pell, dolor abdominal, tos, diarrea i mal de coll.

Durant el tractament pot patir infeccions amb més facilitat. Alguns pacient han presentat infeccions lleus, com el refredat comú, però en altres casos els pacients han desenvolupat alguna infecció més greu, com: la pneumònia, la tuberculosi o d'altres infeccions. Per a evitar això, a tots els pacient abans d'iniciar el tractament se'ls fa la prova de la tuberculina, a la pell, i una radiografia de tòrax, per valorar si han estat en contacte amb el bacteri de la tuberculosi. Si les proves són positives, s'administra un tractament per a prevenir la tuberculosi, junt amb el tractament amb Infliximab.

El Infliximab pot afectar el sistema immunològic ("les defenses") del nadó, per aquest motiu, si vostè és una dona en edat de tenir fills, mentre realitzi el tractament amb Infliximab i durant els 6 mesos posteriors a l'última dosi, no ha de quedar-se embarassada i ha d'utilitzar un mètode anticonceptiu segur.

 <p>HOSPITAL COMARCAL de l'Alt Penedès CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDÈS</p>	El/la pacient DNI _____ HC núm. _____ Servei de Digestiu Metge/essa Núm. de col·legiat/ada _____ DECLARO que

El pacient ha de posar-se en contacte amb el seu Digestòleg o amb un Servei Mèdic si li apareix algun efecte secundari greu o algun signe d'infecció (febre, malestar general, etc.).

Riscos personalitzats o professional

A més dels riscos anteriorment detallats, degut a les malalties que vostè pateix, pot presentar altres complicacions, com:

He comprès les explicacions que m'han facilitat, en un llenguatge clar i senzill. El professional que m'ha atès, m'ha permès realitzar totes les observacions i **m'ha aclarit** tots els dubtes que li he plantejat.

Per tant, declaro que estic satisfet/a amb la informació rebuda i comprenc l'abast i els riscos del tractament proposat.

I en aquestes condicions,

- AUTORIZO:** Que em sigui realitzat un tractament amb Infliximab.
- NO AUTORIZO:** Que em sigui realitzat un tractament amb Infliximab.

Signatura del/de la pacient i DNI

Representant legal i DNI

Signatura del/de la professional i
núm. de col·legiat/ada

Vilafranca del Penedès, _____ / _____ / _____