 <p>HOSPITAL COMARCAL de l'Alt Penedès CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDÈS</p>	El/la paciente	
	DNI	HC núm.
	Servicio de Digestivo	
	Médico/a	
	Núm. de colegiado/a	
DECLARO que		

Tratamiento con Adalimumab. Consentimiento Informado

Me ha explicado que, en mi situación, es necesario y/o conveniente realizar un tratamiento con Adalimumab.

1. Información general

Adalimumab es un fármaco que actúa disminuyendo los niveles de TNF α y ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de las personas que padecen una enfermedad inflamatoria intestinal: enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, cuando no responden adecuadamente al tratamiento con otros fármacos. Actualmente se sabe que la sustancia llamada TNF es una de las principales responsables del dolor y la inflamación en las enfermedades inflamatorias intestinales.

2. Descripción del procedimiento

El tratamiento se realiza por inyección subcutánea.

Este tratamiento se realiza de forma continuada, mientras el fármaco mantenga su eficacia y la actividad de la enfermedad lo requiera.

3. Preparación

Antes de iniciar el tratamiento se realizará un estudio al paciente, para detectar infecciones activas.

4. Beneficios esperados


Aliviar los síntomas y frenar la progresión de la enfermedad inflamatoria intestinal.

5. Riesgos específicos más frecuentes de este procedimiento (se recomienda leer el prospecto del medicamento para una mayor y más detallada información).

Durante el tratamiento con este medicamento puede sufrir infecciones con más facilidad. Algunos pacientes han desarrollado infecciones leves como el resfriado común, pero en otros pacientes se ha desarrollado alguna infección más grave como: la neumonía, la tuberculosis u otras infecciones. Para evitar esto, antes de iniciar el tratamiento se realiza, a todos los pacientes: la prueba de la tuberculina, a nivel cutáneo, y una radiografía de tórax, para descartar el contacto previo con la bacteria que produce la tuberculosis. Si las pruebas son positivas se añade un tratamiento para prevenir la tuberculosis, junto al tratamiento con Adalimumab

El Adalimumab afecta el sistema inmunológico ("las defensas") del recién nacido, por este motivo, si es usted una mujer en edad de tener niños, mientras esté en tratamiento con Adalimumab y durante los 6 meses posteriores a la última administración, no debe quedarse embarazada y debe utilizar un método anticonceptivo seguro.

El paciente debe ponerse en contacto con su Digestólogo o con un Servicio Médico si necesita una vacunación, si presenta algún efecto secundario grave o algún signo de infección (fiebre, malestar general, etc.).

 <p>HOSPITAL COMARCAL de l'Alt Penedès CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDÈS</p>	El/la paciente DNI _____ HC núm. _____ Servicio de Digestivo Médico/a Núm. de colegiado/a _____ DECLARO que
---	---

He comprendido las explicaciones que me han facilitado, en un lenguaje claro y sencillo. El profesional que me ha atendido, me ha permitido realizar todas las observaciones y **me ha aclarado** todas las dudas que le he planteado.

Por todo esto, manifiesto que estoy satisfecho/a con la información recibida y comprendo el alcance y los riesgos del tratamiento propuesto.

En estas condiciones,

AUTORIZO: Que me sea realizado un tratamiento con Adalimumab.

NO AUTORIZO: Que me sea realizado un tratamiento con Adalimumab.

Firma del/de la paciente y DNI

Representante legal y DNI

Firma del/de la profesional y
núm. de colegiado/a

Vilafranca del Penedès, _____ / _____ / _____