

 <p><b>HOSPITAL COMARCAL</b> de l'Alt Penedès CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDÈS</p>	El/la paciente DNI Servicio de Digestivo Médico/a Núm. de colegiado/a <b>DECLARO</b> que	HC núm.

## Tratamiento con Infliximab. Consentimiento Informado

---

Me ha explicado que, en mi situación, es necesario y/o conveniente realizar un tratamiento con Infliximab.

### 1. Información general

El Infliximab es un fármaco que actúa disminuyendo los niveles de TNF y ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias intestinales: enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, cuando estas no responden adecuadamente al tratamiento con otros fármacos. Actualmente se sabe que la TNF es una de las principales sustancias responsables del dolor y de la inflamación.

### 2. Descripción del procedimiento

El tratamiento se le administra por vía intravenosa en el Hospital de Día. La administración de cada dosis dura aproximadamente 2 horas.

Se administra la primera dosis, la segunda dosis a las dos semanas, la tercera a las seis semanas, desde el inicio del tratamiento y posteriormente cada 8 semanas. En algunos casos es preciso aumentar la frecuencia en la administración de las dosis.

### 3. Preparación

Antes de iniciar el tratamiento se le realiza una evaluación, que consiste en: historia médica completa, exploración física, analítica general de sangre, prueba de la tuberculina, radiografía de tórax.

### 4. Beneficios esperados

Aliviar los síntomas y frenar la progresión de la enfermedad.

### 5. Riesgos específicos más frecuentes de este procedimiento

#### Riesgos generales:

Durante la administración o después de ella se pueden presentar: dolor de cabeza, náuseas, alteraciones en la presión arterial, picor, fiebre, sofocos, erupciones en la piel, dolor abdominal, tos, diarrea y dolor de garganta.

Puede sufrir infecciones con más facilidad. Algunos pacientes han desarrollado infecciones leves como resfriado común, pero en otros casos los pacientes han desarrollado alguna infección más grave como: neumonía, tuberculosis u otras infecciones. Para evitar esto, a todos los pacientes antes de iniciar el tratamiento se les realiza la prueba de la tuberculina, en piel, y una radiografía de tórax, para ver si han estado previamente en contacto con la bacteria que produce la tuberculosis. Si las pruebas son positivas, se añade un tratamiento para prevenir la tuberculosis, junto con el tratamiento con Infliximab.

El Infliximab afecta el sistema inmunológico ("las defensas") del recién nacido. Por este motivo, si es usted una mujer en edad de tener niños, mientras esté en tratamiento con Infliximab y durante los 6 meses posteriores a la última administración no debe quedarse embarazada y debe utilizar un método anticonceptivo seguro.

 <p><b>HOSPITAL COMARCAL</b> de l'Alt Penedès CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDÈS</p>	El/la paciente DNI _____ HC núm. _____ Servicio de Digestivo Médico/a _____ Núm. de colegiado/a _____ <b>DECLARO</b> que

El paciente debe ponerse en contacto con su Digestólogo o con un Servicio Médico, si presenta algún efecto secundario grave o algún signo de infección (fiebre, malestar general, etc.).

**Riesgos personalizados o profesionales:**

Además de los riesgos anteriormente citados por la/s enfermedad/es que usted padece puede presentar otras complicaciones, como:

\_\_\_\_\_

**He comprendido** las explicaciones que me han facilitado, en un lenguaje claro y sencillo. El profesional que me ha atendido, me ha permitido realizar todas las observaciones y **me ha aclarado** todas las dudas que le he planteado.

Por todo esto, manifiesto que estoy satisfecho/a con la información recibida y comprendo el alcance y los riesgos del tratamiento propuesto.

En estas condiciones,

- AUTORIZO:** Que me sea realizado un tratamiento con Infliximab.
- NO AUTORIZO:** Que me sea realizado un tratamiento con Infliximab.

Firma del/de la paciente y DNI

Representante legal y DNI

Firma del/de la profesional y  
núm. de colegiado/a

Vilafranca del Penedès, \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_