

## Preparació del còlon per la realització d'una colonoscòpia amb CASENGLICOL

*Servei Digestiu i Endoscòpia*

<b>3 DIES ABANS DE LA PROVA INICIAR UNA DIETA POBRA EN FIBRA VEGETAL</b>	
<b>X NO POT MENJAR</b>	<b>SI POT MENJAR</b>
Fruites, verdures, llegums i productes integrals.	Sopes, pasta, arròs, patates bullides, llet i derivats, pa blanc, ous, carn i peix. Pot prendre sucs de fruita però ben colats.

**EL DIA ANTERIOR ESMORZAR SENSE FIBRA I DESPRÉS INICIAR UNA DIETA LÍQUIDA PER DINAR I SOPAR**  
(brous colats, sucs de fruita colats, begudes isotòniques, infusions, cafè o llet)

### **SI LA PROVA ÉS AL MATÍ (DE 8 H A 14 H)**

1. EL DIA ANTERIOR, A PARTIR DE LES 16 H PRENDRE 3 SOBRES DISSOLTS EN 3 L D'AIGUA.
2. EL DIA DE LA PROVA, 4 H ABANS PRENDRE 1 SOBRE DISSOLT EN 1 L D'AIGUA.
3. 3h ABANS DE LA PROVA HAURÀ DE QUEDAR EN DEJÚ (NO POT PRENDRE NI TANT SOLS AIGUA).

### **SI LA PROVA ÉS A LA TARDA (DE 15H A 20H)**

1. EL DIA ANTERIOR, A PARTIR DE LES 18 H PRENDRE 2 SOBRES DISSOLTS EN 2 L D'AIGUA.
2. EL DIA DE LA PROVA, 6 H ABANS PRENDRE 2 SOBRES DISSOLTS EN 2 L D'AIGUA.
3. 3 H ABANS DE LA PROVA HAURÀ DE QUEDAR EN DEJÚ (NO POT PRENDRE NI TANT SOLS AIGUA).

Instruccions de preparació de Casenglicol



1)Obrir el sobre de Casenglicol



2)Afegir el contingut del sobre en un recipient d'un litre de capacitat



3)Afegir 1 litre d'aigua al recipient i remenar fins que la pols s'hagi dissolt

➤ Es recomana prendre 1 got de preparat cada 15 – 20 minuts.

### **ADVERTIMENTS**

Durant la preparació pot prendre la seva medicació habitual.
Si pren TRIFLUSAL (DISGREN®), CLOPIDOGREL (PLAVIX®), o PLASUGREL(EFIENT®) a qualsevol dosi, o AAS (ADIRO®, ASPIRINA®,TROMALYT®) en dosis superiors a 150 mg; o altres medicaments per a la coagulació de la sang, l'ha de suspendre 5 dies abans de la prova, tret que el seu metge indiqui el contrari.
Si pren ACENOCUMAROL (SINTROM®) o altre anticoagulant consulta al metge que li controla.
Si pren un preparat amb FERRO, l'ha de deixar de prendre 3 dies abans de la prova.
Si és DIABÈTIC/A i està amb tractament amb antidiabètics orals, no prengui la medicació des de la primera presa de Casenglicol. Si està en tractament amb insulina, la dosi de la nit serà la meitat de l'habitual i no prendrà la dosi matutina el dia de la prova. Si s'administra LIRAGLUTIDE injectable (Victoza®,Saxenda®) suspendre 2 dies abans. Si s'administra SEMAGLUTIDE injectable (Ozempic®) suspendre 7 dies abans de colonoscòpia.

**La colonoscòpia s'ha sol·licitat amb SEDACIÓ**

**El dia de la prova ha de venir acompanyat i no podrà conduir.**

**Si no pot venir o per qualsevol dubte, truqui al telèfon 93.896.00.25 extensió 6416 o bé 3551  
de dilluns a dijous de 8 h a 20 h i els divendres de 8 h a 14 h.**

Hospital Residència Sant Camil

## Preparación del colon para la realización de una colonoscopia con CASENGLICOL

### Servicio Digestivo y Endoscopia

3 DÍAS ANTES DE LA PRUEBA INICIAR UNA DIETA POBRE EN FIBRA VEGETAL	
X NO PUEDE COMER	SI PUEDE COMER
Frutas, verduras, legumbres y productos integrales.	Sopas, pasta, arroz, patatas hervidas, leche y derivados, pan blanco, huevos, carne y pescado. Puede tomar zumos de fruta pero bien colados.


**EL DÍA ANTERIOR DESAYUNAR SIN FIBRA Y DESPUÉS INICIAR UNA DIETA LÍQUIDA PARA LA COMIDA Y LA CENA**  
(caldo colado, zumos de fruta colados, bebidas isotónicas, infusiones, café o leche)

#### SI LA PRUEBA ES POR LA MAÑANA (DE 8 H A 14 H)

1. EL DÍA ANTERIOR, A PARTIR DE LAS 16 H TOMAR 3 SOBRES DISUELTO EN 3 L DE AGUA.
2. EL DÍA DE LA PRUEBA, 4 H ANTES TOMAR 1 SOBRE DISUELTO EN 1 L DE AGUA.
3. 3 H ANTES DE LA PRUEBA DEBERÁ QUEDAR EN AYUNAS (NO PUEDE TOMAR NI SÍQUIERA AGUA).

#### SI LA PRUEBA ES POR LA TARDE (15 H A 20 H)

1. EL DÍA ANTERIOR, A PARTIR DE LAS 18 H TOMAR 2 SOBRES DISUELTO EN 2 L DE AGUA.
2. EL DÍA DE LA PRUEBA, 6 H ANTES TOMAR 2 SOBRES DISUELTO EN 2 L DE AGUA.
3. 3 H ANTES DE LA PRUEBA DEBERÁ QUEDAR EN AYUNAS (NO PUEDE TOMAR NI SÍQUIERA AGUA).



#### ADVERTENCIAS

Durante la preparación puede tomar su medicación habitual.
Si toma TRIFLUSAL (DISGREN®), CLOPIDOGREL (PLAVIX®), o PLASUGREL (EFIENT®) a cualquier dosis, o AAS (ADIRO®, ASPIRINA®, TROMALYT®) en dosis superiores a 150 mg; u otros medicamentos para la coagulación de la sangre, la tiene que suspender 5 días antes de la prueba, excepto que su médico indique lo contrario.
Si toma ACENOCUMAROL (SINTROM®) u otro anticoagulante consulte al médico que le controla.
Si toma un preparado con HIERRO, lo tienen que dejar de tomar 3 días antes de la prueba.
Si es DIABÉTICO/A y está con tratamiento con antidiabéticos orales, no tome la medicación desde la primera toma de Casenglicol. Si está en tratamiento con insulina, la dosis de la noche será la mitad de la habitual y no tomará la dosis matutina el día de la prueba. Si se administra LIRAGLUTIDE inyectable (Victozza®, Saxenda®) suspender 2 días antes. Si se administra SEMAGLUTIDE injectable (Ozempic®) suspender 7 días antes de colonoscopia.

**La colonoscopia se ha solicitado con SEDACIÓN**

**El día de la prueba tiene que venir acompañado y no podrá conducir.**

**Si no puede venir o por cualquier duda, llame al teléfono 93.896.00.25 extensión 6416 o bien 3551  
de lunes a jueves de 8 h a 20 h y los viernes de 8 h a 14 h.**

Hospital Residència Sant Camil