

Preparació del còlon per la realització d'una colonoscòpia amb MOVIPREP

Servei Digestiu i Endoscòpia

3 DIES ABANS DE LA PROVA INICIAR UNA DIETA POBRA EN FIBRA VEGETAL

X NO POT MENJAR	SI POT MENJAR
Fruïtes, verdures, llegums i productes integrals.	Sopes, pasta, arròs, patates bullides, llet i derivats, pa blanc, ous, carn i peix. Pot prendre suc de fruita però ben colats.

EL DIA ANTERIOR ESMORZAR SENSE FIBRA I DESPRÉS INICIAR UNA DIETA LÍQUIDA PER DINAR I SOPAR (brous colats, suc de fruita colats, begudes isotòniques, infusions, cafè o llet).


SI LA PROVA ÉS DE 8 H A 11 H

- EL DIA ANTERIOR, A PARTIR DE LES **16 H** PRENDRE **1 PAQUET (SOBRE A + SOBRE B)** DISSOLT EN **1 L** D'AIGUA, DESPRÉS ½ LITRE D'AIGUA MÉS.
- EL DIA ANTERIOR, A PARTIR DE LES **20 H** PRENDRE **1 PAQUET (SOBRE A + SOBRE B)** DISSOLT EN **1 L** D'AIGUA, DESPRÉS ½ LITRE D'AIGUA MÉS.
- POT PRENDRE EXCLUSIVAMENT AIGUA FINS A 3 H ABANS DE LA PROVA**


SI LA PROVA ÉS D'11.30 H A 20 H

- EL DIA ANTERIOR, A PARTIR DE LES **16 H** PRENDRE **1 PAQUET (SOBRE A + SOBRE B)** DISSOLT EN **1 L** D'AIGUA, DESPRÉS ½ LITRE D'AIGUA MÉS.
- EL DIA DE LA PROVA, **5 H ABANS** PRENDRE **1 PAQUET (SOBRE A + SOBRE B)** DISSOLT EN **1 L** D'AIGUA, DESPRÉS ½ LITRE D'AIGUA MÉS.
- 3 H ABANS DE LA PROVA HAURÀ DE QUEDAR EN DEJÚ (NO POT PRENDRE NI TAN SOLS AIGUA).**


Instruccions de preparació de MOVIPREP




1) Obrir
Una de les bosses i treure els sobres A i B.



2) Afegir el contingut dels sobres A i B en un recipient d'1 litre de capacitat



3) Afegir 1 litre d'aigua al recipient



4) Remenar fins que tota la pols s'hagi dissolt i la solució sigui clara o lleugerament tèrbola. Aquest procés pot trigar fins a 5 minuts.

➤ **Es recomana prendre 1 got de preparat cada 15 – 20 minuts.**

ADVERTIMENTS

Durant la preparació pot prendre la seva medicació habitual.

Si pren TRIFLUSAL (DISGREN®), CLOPIDOGREL (PLAVIX®), o PLASUGREL (EFIENT®) a qualsevol dosi, o AAS (ADIRO®, ASPIRINA®, TROMALYT®) en dosis superiors a 150 mg; o altres medicaments per a la coagulació de la sang, l'ha de suspendre 5 dies abans de la prova, tret que el seu metge indiqui el contrari.

Si pren ACENOCUMAROL (SINTROM®) o altre anticoagulant consulti al metge que li controla.

Si pren un preparat amb FERRO, l'ha de deixar de prendre 3 dies abans de la prova.

Si és DIABÈTIC/A i està amb tractament amb antidiabètics orals, no prengui la medicació des de la primera presa de Casenglicol. Si està en tractament amb insulina, la dosi de la nit serà la meitat de l'habitual i no prendrà la dosi matutina el dia de la prova.

Si s'administra LIRAGLUTIDE injectable (Victoza®, Saxenda®) suspendre 2 dies abans.

Si s'administra SEMAGLUTIDE injectable (Ozempic®) suspendre 7 dies abans de colonoscòpia.

La colonoscòpia s'ha sol·licitat amb SEDACIÓ

El dia de la prova ha de venir acompanyat i no podrà conduir.

Si no pot venir o per qualsevol dubte, truqui al telèfon 93.896.00.25 extensió 6416 o bé 3551 de dilluns a dijous de 8 h a 20 h i els divendres de 8 h a 14 h.

Hospital Residència Sant Camil

Preparación del colon para la realización de una colonoscopia con MOVIPREP

Servicio Digestivo y Endoscopia

3 DÍAS ANTES DE LA PRUEBA INICIAR UNA DIETA POBRE EN FIBRA VEGETAL

X NO PUEDE COMER	SI PUEDE COMER
Frutas, verduras, legumbres y productos integrales.	Sopas, pasta, arroz, patatas hervidas, leche y derivados, pan blanco, huevos, carne y pescado. Puede tomar zumos de fruta pero bien colados.

EL DÍA ANTERIOR DESAYUNAR SIN FIBRA Y DESPUÉS INICIAR UNA DIETA LÍQUIDA PARA LA COMIDA Y LA CENA (caldo colado, zumos de fruta colados, bebidas isotónicas, infusiones, café o leche)

SI LA PRUEBA ES DE 8 H A 11 H

1. EL DÍA ANTERIOR, A PARTIR DE LAS **16 H** TOMAR **1 PAQUETE (SOBRE A + SOBRE B)** DISUELTO EN **1 l** DE AGUA. DESPUÉS ½ LITRO DE AGUA MÁS.
2. EL DÍA ANTERIOR, A PARTIR DE LAS **20 H** TOMAR **1 PAQUETE (SOBRE A + SOBRE B)** DISUELTO EN **1 l** DE AGUA. DESPUÉS ½ LITRO DE AGUA MÁS.
3. **PUEDE TOMAR EXCLUSIVAMENTE AGUA HASTA 3 HORAS ANTES DE LA PRUEBA.**

SI LA PRUEBA ES DE 11.30 H A 20 H

1. EL DÍA ANTERIOR, A PARTIR DE LAS **16 H** TOMAR **1 PAQUETE (SOBRE A + SOBRE B)** DISUELTO EN **1 l** DE AGUA. DESPUÉS ½ LITRO DE AGUA MÁS.
2. EL DÍA DE LA PRUEBA, **4 H ANTES** TOMAR **1 PAQUETE (SOBRE A + SOBRE B)** DISUELTO EN **1 l** DE AGUA. DESPUÉS ½ LITRO DE AGUA MÁS.
3. **3 H ANTES DE LA PRUEBA DEBERÁ QUEDAR EN AYUNAS (NO PUEDE TOMAR NI SIQUIERA AGUA).**




1) Abrir una de las bolsas y sacar los sobres A y B.



2) Añadir el contenido de los sobres A y B en un recipiente de 1 litro de capacidad



3) Añadir 1 litro de agua al recipiente



4) Remover hasta que todo el polvo se haya disuelto y la solución sea clara o ligeramente turbia. Este proceso puede tardar hasta 5 min.

Instrucciones de preparación de MOVIPREP

- Se recomienda tomar 1 vaso de preparado cada 15 – 20 minutos.

ADVERTENCIAS

Durante la preparación puede tomar su medicación habitual.

Si toma TRIFLUSAL (DISGREN®), CLOPIDOGREL (PLAVIX®), o PLASUGREL (EFIENT®) a cualquier dosis, o AAS (ADIRO®, ASPIRINA®, TROMALYT®) en dosis superiores a 150 mg; u otros medicamentos para la coagulación de la sangre, la tiene que suspender 5 días antes de la prueba, excepto que su médico indique lo contrario.

Si toma ACENOCUMAROL (SINTROM®) u otro anticoagulante consulte al médico que le controla.

Si toma un preparado con HIERRO, lo tiene que dejar de tomar 3 días antes de la prueba.

Si es DIABÉTICO/A y está con tratamiento con antidiabéticos orales, no tome la medicación des de la primera toma de Casenglicol. Si está en tratamiento con insulina, la dosis de la noche será la mitad de la habitual y no tomará la dosis matutina el día de la prueba.

Si se administra LIRAGLUTIDE inyectable (Victoza®, Saxenda®) suspender 2 días antes.

Si se administra SEMAGLUTIDE inyectable (Ozempic®) suspender 7 días antes de colonoscopia.

La colonoscopia se ha solicitado con SEDACIÓN

El día de la prueba tiene que venir acompañado y no podrá conducir.

Si no puede venir o por cualquier duda, llame al teléfono 93.896.00.25 extensión 6416 o bien 3551 de lunes a jueves de 8 h a 20 h y los viernes de 8 h a 14 h.

Hospital Residència Sant Camil