

Preparació del colon per la realització d'una colonoscòpia amb solució BOHM

DIA.....INICIAR UNA DIETA POBRA EN FIBRA VEGETAL

X NO POT MENJAR	X SI POT MENJAR
Fruites, verdures, llegums i productes integrals.	Sopes, pasta, arròs, patates bullides, llet i derivats, pa blanc, ous, carn i peix. Pot prendre suc de fruita però ben colats.

DIA.....ESMORZAR SENSE FIBRA I DESPRÉS INICIAR UNA DIETA LÍQUIDA

(brous colats, suc de fruita colats, begudes isotòniques, infusions, cafè o llet)



DIA.....HORA.....SOBRES.....AIGUA.....

DIA.....HORA.....SOBRES.....AIGUA.....

DIA.....HORA.....SOBRES.....AIGUA.....

A partir de les..... haurà de quedar en dejú (NO pot prendre ni tan sols aigua)

Instruccions de preparació de la sol·lució Bohm



- Es recomana prendre 1 got de preparat cada 15-20 minuts.
- En total ha de prendre 4L de preparat.

ADVERTIMENTS

Durant la preparació pot prendre la seva medicació habitual.

Si pren TRIFLUSAL (DISGREN®), CLOPIDOGREL (PLAVIX®), o PLASUGREL (EFIENT®) a qualsevol dosi, o AAS (ADIRO®, ASPIRINA®, TROMALYT®) en dosis superiors a 150 mg; o altres medicaments per a la coagulació de la sang, l'ha de suspendre 5 dies abans de la prova, tret que el seu metge indiqui el contrari.

Si pren ACENOCUMAROL (SINTROM®) o altre anticoagulant consulti al metge que li controla.

Si pren un preparat amb FERRO, l'ha de deixar de prendre 3 dies abans de la prova.

Si és DIABÈTIC/A i està amb tractament amb antidiabètics orals, no prengui la medicació des de la primera presa de solució Bohm. Si està en tractament amb insulina, la dosi de la nit serà la meitat de l'habitual i no prendrà la dosi matutina el dia de la prova.

Si s'administra LIRAGLUTIDE injectable (Victoza®, Saxenda®) suspendre 2 dies abans.

Si s'administra SEMAGLUTIDE injectable (Ozempic®) suspendre 7 dies abans de colonoscòpia.

La colonoscòpia s'ha sol·licitat amb **SEDACIÓ**

El dia de la prova **ha de venir acompanyat i no podrà conduir.**

Si no pot venir o per qualsevol dubte, truqui al telèfon **93.896.00.25 extensió 6416 o bé 6505 de **dilluns a dijous de 8 h a 20 h i els divendres de 8 h a 15 h.****

Hospital Residència Sant Camil