

## PREPARACIÓN DE COLONOSCOPIA CON POLIETILEGLICOL. (Casenglicol®)

### **3 DIAS ANTES** DE LA PRUEBA INICIAR UNA DIETA POBRE EN FIBRA VEGETAL

<b>X NO PUEDE COMER</b>	<b>✓ SI PUEDE COMER</b>
<b>Frutas, verduras, legumbres y productos integrales</b>	Sopas,. pasta, arroz, patatas hervidas, leche y derivados, pan blanco, huevos, carne, y pescado. Puede tomar zumos de fruta pero bien colados.

#### **SI LA PRUEBA ES POR LA MAÑANA( 8H A 14H) :**

**DIA ANTERIOR, A PARTIR DE LAS 18h TOMAR 3 SOBRES DISUELTOS EN 3 L DE AGUA  
DIA DE LA PRUEBA, 4 HORAS ANTES TOMAR 1 SOBRE DISUELTO EN 1L DE AGUASTA**

**A partir de 3 HORAS ANTES DE LA PRUEBA deberá quedarse en ayunas (NO puede tomar ni siquiera agua)**

**SE RECOMIENDA TOMAR 1 VASO DE PREPARADO CADA 15-20 MINUTOS**

✓

#### **LA PRUEBA ES POR LA MAÑANA( 8H A 14H) :**

**DIA ANTERIOR, A PARTIR DE LAS 18h TOMAR 3 SOBRES DISUELTOS EN 3 L DE AGUA  
SI**

**DIA DE LA PRUEBA, 4 HORAS ANTES TOMAR 1 SOBRE DISUELTO EN 1L DE AGUA**

**A partir de 3 HORAS ANTES DE LA PRUEBA deberá quedarse en ayunas (NO puede tomar ni siquiera agua)**

**SE RECOMIENDA TOMAR 1 VASO DE PREPARADO CADA 15-20 MINUTOS**

#### **SI LA PRUEBA ES POR LA TARDE( 15H A 20H) :**

**DIA ANTERIOR, A PARTIR DE LAS 18h TOMAR 2 SOBRES DISUELTOS EN 2 L DE AGUA**

**DIA DE LA PRUEBA ,6 HORAS ANTES TOMAR 2 SOBRES DISUELTOS EN 2L DE AGUA**

**A partir de 3 HORAS ANTES DE LA PRUEBA deberá quedarse en ayunas (NO puede tomar ni siquiera agua)**

**SE RECOMIENDA TOMAR 1 VASO DE PREPARADO CADA 15-20 MINUTOS**

#### **ADVERTENCIAS**

- ✓ Durante la preparación puede tomar su medicación habitual.
- ✓ Si toma TRIFLUSAL (DISGREN®), CLOPIDOGREL (PLAVIX®), o PLASUGREL(EFIENT®) en cualquier

dosis, o AAS (ADIRO®, ASPIRINA®,TROMALYT®) en dosis superiores a 150 mg; u otros medicamentos para la coagulación de la sangre, debe suspenderla 5 días antes de la prueba, salvo que su médico indique lo contrario.

- ✓ Si toma ACENOCUMAROL (SINTROM®) u otro anticoagulante consulte al médico que le controla.
- ✓ Si toma algún preparado con HIERRO, debe dejar de tomarlo 3 días antes de la prueba.
- ✓ Si es DIABETICO/A y está en tratamiento con antidiabéticos orales, no tome la medicación desde la primera toma de solución Bohm. Si está en tratamiento con insulina, la dosis de la noche será la mitad de la habitual y no tomará la dosis matutina el día de la prueba.

La colonoscopia se ha solicitado con **SEDACIÓN**

El día de la prueba **ha de venir acompañado y no podrá conducir.**

**Si no puede venir o para cualquier duda, llame al teléfono 93.896.00.25 extensión 3551, 6416 o bien 6505 de lunes a jueves de 8h a 20h i los viernes de 8h a 15h.**



## PREPARACIÓ DE COLONOSCOPIA AMB POLIETILENGLICOL (Casenglicol®)

**3 DIES ABANS DE LA PROVA INICIAR UNA DIETA POBRE EN FIBRA VEGETAL**

**X NO POT MENJAR**

**✓ SI POT MENJAR**

Fruites,verdures,llegums i productes integrals.

Sopes, pasta, arròs, patates bullides, llet i derivats, pa blanc, ous, carn i peix. Pot prendre sucs de fruita però ben colats.

**DIA ANTERIOR, ESMORZAR I DESPRÉS INICIAR UNA DIETA LÍQUIDA** (brous colats, sucs de fruita colats, begudes isotòniques, infusions ,café o llet)

**SI LA PROVA SE LI FA AL MATÍ ( 8H A 14H) :**

**DIA ANTERIOR, A PARTIR DE LES 18h HA DE PRENDRE 3 SOBRES DISOLTS EN 3 L DE AIGUA**

**DIA DE LA PROVA, 4 HORES ABANS HA DE PRENDRE 1 SOBRE DISOLT EN 1L DE AIGUA**

**A partir de 3 HORES ABANS DE LA PROVA** haurà de quedar-se en dejú (**NO pot prendre ni tan sols aigua**)

ES RECOMANA PRENDRE UN GOT DEL PREPARAT CADA 15-20 MINUTS

**SI LA PROVA SE LI FA A LA TARDA( 15H A 20H) :**

**DIA ANTERIOR, A PARTIR DE LAS 18h HA DE PRENDRE 2 SOBRES DISOLTS EN 2 L DE AIGUA**

**DIA DE LA PROVA, 6 HORES ABANS HA DE PRENDRE 2 SOBRES DISOLTS EN 2L DE AIGUA**

**A partir de 3 HORAS ABANS** s`haurà de quedar en dejú (**NO pot prendre ni tan sols aigua**)

ES RECOMANA PRENDRE UN GOT DEL PREPARAT CADA 15-20 MINUTS

### ADVERTIMENTS

- ✓ Durant la preparació pot prendre la seva medicació habitual.
- ✓ Si pren TRIFLUSAL (DISGREN®), CLOPIDOGREL (PLAVIX®), o PLASUGREL(EFIENT®) a qualsevol dosis, o AAS (ADIRO®, ASPIRINA®,TROMALYT®) en dosis superiores a 150 mg; o altres medicaments

per a la coagulació de la sang, l' ha de suspendre 5 dies abans de la prova, tret que el seu metge indiqui el contrari.

✓ Si pren ACENOCUMAROL (SINTROM®) o altre anticoagulant consulti al metge que li controla.

✓ Si pren un preparat amb FERRO, l' ha de deixar de prendre 3 dies abans de la prova.

✓ Si es DIABETIC/A i està amb tractament amb antidiabètics orals, no prengui la medicació des de la primera presa de solució Bohm. Si està en tractament amb insulina, la dosi de la nit serà la meitat de l'habitual i no prendrà la dosi matutina el dia de la prova.

**La colonoscòpia s'ha sol·licitat amb SEDACIÓ**

**El dia de la prova ha de venir acompanyat i no podrà conduir.**

**Si no pot venir o per qualsevol dubte, truqui al telèfon 93.896.00.25 extensió 3551, 6416 o bé 6505 de dilluns a dijous de 8h a 20h i els divendres de 8h a 15h.**