

ADALIMUMAB 40 mg (HYRIMOZ®)

Servei de Farmàcia

Adalimumab és un agent biològic que actua reduint el dolor i la inflamació associat a certes malalties autoimmunes com artritis reumatoide, espondilitis anquilosant, artritis psoriàsica, psoriasis o malaltia de Crohn.


Com s'ha d'administrar?

Adalimumab s'administra per via subcutània (sota la pell). No administrar on la pell estigui envermellida, escatada, tingui un blau o estigui dura. Evitar també zones amb cicatrius.

La dosi inicial pot variar depenent de la patologia, sent la dosi de manteniment habitual de 40 mg (una ploma) cada dues setmanes.

Adalimumab es conserva en el frigorífic. Tregui'l del frigorífic, 30-60 minuts abans d'administrar. En cas de tenir febre alta (>38°C), retardar l'administració. En cas de vacunar-se, retardar també l'administració almenys 5 dies.

On es pot administrar? En les zones en gris al dibuix:



Què fer si s'oblida una dosi?

Administrar-la lo abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que l'oblidada.

La dosi següent s'administrarà el mateix dia que estava previst inicialment, com si no s'hagués oblidat.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu durant el tractament i fins 5 mesos després de finalitzar-lo.

Si es quedés embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge. Evitar la lactància durant el tractament i fins 5 mesos després de finalitzat.

Algunes vacunes estan contraindicades durant el tractament amb Adalimumab. Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans de vacunar-se.

Presentacions comercials

Presentacions en el nostre centre:

- Adalimumab 40 mg Ploma precarregada

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir amb l'efecte d'Adalimumab. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Adalimumab trobem:

Risc augmentat de patir infeccions (que es poden manifestar amb febre, ferides, malestar general, problemes dentals, tos, molèsties a l'orinar); inflamació, dolor, envermelliment, pruija en el lloc d'injecció; reacció al·lèrgica (erupció cutània, dificultat per respirar, inflamació de la cara, mans o peus); debilitat en braços o cames; visió doble; formigueig; dolor en el pit; peus i turmells inflats; mal de cap; nàusees i diarrea; Psoriasi paradoxal.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Conservi en nevera (entre 2 i 8°C). No s'ha de congelar.

Ha de mantenir el medicament en el seu envàs original fins al moment de l'administració, ja que s'ha de protegir de la llum.

Si per accident la medicació queda fora de la nevera, la medicació és estable 42 dies a temperatura ambient (llençar passats els 42 dies). Si ha de viatjar, ha de transportar el seu medicament en una nevera refrigerada portàtil i guardar-ho el més aviat possible a la nevera.

Mantenir fora de l'abast dels nens

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

