

ATAZANAVIR/COBICISTAT 300/150 mg comprimits (Evotaz®)

Servei de Farmàcia

Conté els principis actius Atazanavir i Cobicistat.

Atazanavir és un inhibidor de la proteasa, és a dir, bloqueja un enzim anomenat proteasa que participa en la reproducció del VIH.

Al bloquejar aquest enzim el virus no es reproduïx de forma normal i es frena la propagació de la infecció.

Cobicistat potencia els efectes d'Atazanavir al prolongar el seu temps d'acció en l'organisme.

A l'administrar Evotaz® en combinació amb altres fàrmacs antiretrovirals, es redueix la quantitat de VIH en sang i es manté a nivells baixos. Evotaz® no cura la infecció per VIH ni la SIDA, però sí pot retardar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició d'infeccions i malalties associades a la SIDA.

Com s'ha de prendre?

Els comprimits s'han de prendre sencers, no es poden obrir, mastegar o trencar i amb un got d'aigua o una altra beguda.

S'ha de prendre amb aliments.

Què fer si s'oblida una dosi?

Prengui-la l'abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que l'oblidada.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Evotaz® no es pot prendre si vostè està fent hemodiàlisi o té una insuficiència hepàtica de moderada a greu.

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu eficaç durant el tractament. Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte d'Evotaz®. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Evotaz® trobem:

- Icterícia, icterícia ocular i nàusees.

Amb menor freqüència: augment de la gana, insomni, mal de cap, mareig, somnolència, disgeusia, trastorns gastrointestinals (nàusees, vòmits, diarrea, dolor abdominal, flatulència) cansament i rash.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Mantingui els comprimits en l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>