

COLISMETAT DE SODI (Promixin®)

Servei de Farmàcia

Promixin® conté el colismetat de sodi com a principi actiu. S'administra de forma inhalatòria per tractar infeccions respiratòries cròniques en pacients amb fibrosi quística (tant en adults com en nens).


S'utilitza quan aquestes infeccions són causades per un bacteri específic anomenat *Pseudomonas aeruginosa*. Aquesta és un bacteri comú que infecta els pulmons de quasi tots els pacients amb fibrosi quística.

Com s'ha de preparar?


La seva administració és per nebulització mitjançant el nebulitzador adequat.

Abans de posar Promixin® al nebulitzador i inhalar-lo s'ha de dissoldre primer amb aigua estèril o una mescla a parts iguals d'aigua estèril i sèrum salí estèril al 0,9% tal com s'indica a continuació. En les instruccions que acompanyen el nebulitzador s'indica el volum correcte de líquid que s'ha d'afegir al vial de Promixin®.

- 1) Localitzar la vora al tap vermell de plàstic a prop de la fletxa amb la marca "FLIP UP". Després, aguantar el vial amb una mà i el tap de plàstic amb l'altra, girar el tap de plàstic en sentit contrari a les agulles del rellotge.




- 2) Agafar el tap de plàstic tal com es mostra en la figura 2 i lentament estirar d'ell lentament.






- 3) Girar el vial perquè el tap de plàstic quedi orientat cap a vostè. Subjectant el tap pel centre, estirar d'ell cap a baix i girar-ho lleugerament o bé cap a la dreta o bé cap a l'esquerra perquè el segell metàl·lic es trenqui només per un costat.



- 4) Una vegada trencat, agafar el vial fermament i treure el segell metàl·lic per deixar al descobert tot el tap de goma.



- 5) Treure el tap de goma del vial de Primoxin® subjectant només la vora exterior del tap i posar-lo cap per avall sobre una superfície neta. Afegir a poc a poc aigua estèril o la mescla d'aigua estèril i sèrum salí estèril al 0,9% al vial (a les instruccions del nebulitzador trobarà el volum exacte de líquid a afegir).
- 6) Tornar a posar el tap de goma i girar el vial cap per avall amb compte dos cops.
- 7) Fer rodar el vial amb compte entre les mans per dissoldre tota la pols de Primoxin® visible en el vas i al costat del vial. No agitar el vial molt fort ja que això podria fer que la solució formés escuma.
- 8) Quan la pols ja s'hagi dissolt, deixar reposar el vial entre 5-10 minuts perquè desaparegui la mica d'escuma formada i que qualsevol part de pols es dissolgui. Posar la solució en el nebulitzador i inhalar immediatament.

Què fer si s'oblida una dosi?

Apliqui la dosi tan aviat com sigui possible, a no ser que aquesta estigui pròxima a l'hora de la següent dosi.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Interaccions amb altres medicaments

No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Interaccions amb els relaxants musculars no despolaritzans (ex. Vecuroni, Vimacure, Rocuroni).

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Promixin® trobem:

- Reaccions al·lèrgiques que es manifesten en erupcions cutànies
- Tos
- Opressió en el pit
- Broncoconstricció
- Broncoespasme
- Irritació al coll
- Irritació bucal
- Mal de coll

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Els vials de Promixin® sense obrir no requereixen cap tipus de conservació especial.

Una vegada preparades les solucions de Promixin® s'han d'utilitzar preferiblement immediatament. Si això no és possible, les solucions no s'han de conservar durant un període superior de 24 hores en un frigorífic.

No utilitzi cap solució que hagi estat preparada durant més de 24 h.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Mantenir fora de l'abast als nens

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

