

DARUNAVIR 800 mg /COBICISTAT 150 mg/EMTRICITABINA 200 mg/TENOFOVIR ALAFENAMIDA 10 mg (Symtuza®)

Servei de Farmàcia

Conté 4 principis actius:

- **Darunavir** és un inhibidor de la proteasa.
- El **cobicistat** potencia els efectes del darunavir al prolongar el seu temps d'acció en l'organisme.
- **Emtricitabina i Tenofovir alafenamida** són medicaments inhibidors de la transcriptasa inversa.

En bloquejar aquests enzims el virus no es reproduceix de forma normal i es frena la propagació de la infecció.

A l'administrar Symtuza®, es redueix la quantitat de VIH en sang i es manté a nivells baixos. Symtuza® no cura la infecció per VIH ni la SIDA, però si pot retardar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició d'infeccions i malalties associades a la SIDA.

Com s'ha de prendre?

La dosi recomanada en adults **és d'1 comprimit un cop al dia amb aliments** (estómac ple). El comprimit s'ha de prendre sencer amb aigua, llet o beguda nutricional.

Prengui Symtuza al voltant de la mateixa hora tots els dies.

Què fer si s'oblida una dosi?

Si se n'adona compte en menys de 12 hores després de l'hora a la que normalment el pren, prengui el comprimit immediatament amb algun aliment. Després continuï amb la següent dosi a l'hora habitual.

Si se n'adona compte a les 12 hores o més després de l'hora a la que el pren normalment Symtuza, no prengui la dosi oblidada i prengui després la dosi següent a l'hora habitual.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Symtuza® esta contraindicat en pacients amb insuficiència hepàtica greu.

No prengui Symtuza si és al·lèrgic a algun dels seus components.

Utilitzar Symtuza® amb precaució en pacients amb al·lèrgia a les sulfamides.

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu **no hormonal** eficaç durant el tractament. Si es quedés embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament, a més el nen pot infectar-se amb el VIH a través de la llet materna.

Interaccions amb altres medicaments

No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

No combini Symtuza amb: Alfuzosina, amiodarona, dronedarona, quinidina, ranolazina, carbamazepina, fenobarbital, fenitoïna, colchicina si té problemes de fetge o ronyó, rifampicina, pimozina, quetiapina, lurasidona, alcaloides ergotamínics com ergotamina, dihidroergotamina, ergometrina i metilergonovina, Hipèric o herba de Sant Joan, lovastatina, simastatins i lomitapida, triazolam o midazolam oral, sildenafil, avanafil, ticagrelor.

Altres medicaments poden afectar/ ser afectats per Symtuza. CONSULTI-HO

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Symtuza® trobem:

mal de cap, trastorns gastrointestinals (vòmits, diarrea), reacció d'hipersensibilitat, anorèxia, augment dels nivells de colesterol, triglicèrids i glucosa en sang i possible augment de sagnat en pacients hemofílics.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos. Inclòs si es tracta d'algun no descrit en el prospecte.

Conservació

Mantingui els comprimits en l'envàs original ben tancat, a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat. Manténir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>

