

DAPSONA (Dapson-Fatol®)

Servei de Farmàcia

Dapson-Fatol® conté el principi actiu dapsona. No està comercialitzat a Espanya i s'importa via medicació estrangera amb autorització del Ministeri de Sanitat.

Dapsona és una sulfona que està indicada com a tractament de diverses patologies: dermatosis ampul·loses, pemfigoide ampul·lós, psoriasi pustulosa, exacerbacions del lupus eritematós, reumatisme articular crònic i lepra.

Com s'ha de prendre?

Dapson-Fatol® s'administra per via oral amb abundant líquid i preferiblement després d'un àpat.

La dosi recomanada vindrà determinada per la patologia i li indicarà el seu metge.

Cal prendre la dosi exacta que li ha prescrit el seu metge.

Què fer si s'oblida una dosi?

Prengui-la l'abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que l'oblidada. Prengui-la amb un àpat.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

No administrar en pacients amb:

- hipersensibilitat a sulfones i sulfonamides
- anèmia greu
- porfíria
- malaltia hepàtica greu

Si creu que pot estar embarassada informi al seu metge ràpidament.

No es recomana administrar durant l'embaràs i l'al·letament.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Dapsona-Fatol®.

No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Dapsona-Fatol® trobem:

- nàusees.
- molèsties gàstriques
- mal de cap
- descens de l'hemoglobina
- reaccions d'hipersensibilitat en forma d'erupcions

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos o qualsevol altre no descrit.

Conservació

Conservi a temperatura ambient (per sota de 30°C) en un lloc fresc i sec.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs.

