

DARBEPOETINA (Aranesp®)

Servei de Farmàcia

Aranesp® conté el principi actiu Darbepoetina.


Darbepoetina s'utilitza per tractar l'anèmia associada a la insuficiència renal crònica. Funciona exactament igual que l'hormona natural eritropoetina que es produeix als ronyons i ajuda a la medul·la òssia a produir més glòbuls vermells.

Com s'ha de prendre ARANEP®?

Aranesp® s'administra per via subcutània (sota la pell). Normalment s'administra una vegada a la setmana, cada dues setmanes o mensualment, depèn de les necessitats de cada pacient. El seu metge li indicarà cada quant s'ho ha de prendre.

Cal anar variant el lloc d'administració.

La injecció li posaran a l'ambulatori o se la pot administrar vostè mateix sempre que li hagin ensenyat abans.



Què fer si s'oblida de prendre una dosi?

Si s'oblida d'injectar-se una dosi d'ARANESP® consulti al seu metge o al farmacèutic per saber quan s'ha d'administrar la següent.

No s'administri mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Quant de temps dura el tractament?

La duració del tractament dependrà de cada pacient, segons el resultat de les analítiques de seguiment.

Precaucions

En pacients amb hipertensió arterial no controlada.

En pacients amb al·lèrgia al làtex cal tenir en compte que la coberta de l'agulla de la xeringa precarregada conté un derivat del làtex que pot provocar reaccions al·lèrgiques.

No hi ha estudis d'administració d'Aranesp® en dones embarassades i durant la lactància.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte d'Aranesp®.

No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Tots els medicaments poden produir efectes secundaris.

Aranesp® pot produir:

- Augment de la pressió arterial. Si vostè té mal de cap (migranya), comença a sentir-se confús o té convulsions, avisi al seu metge.
- Dolor en el punt d'injecció, normalment és de curta durada, lleu i més freqüent a l'inici del tractament.

En iniciar el tractament amb Aranesp® es pot produir una erupció generalitzada amb envermelliment i butllofes a la pell i la mucosa oral, ulls, nas, gola o zona genital acompanyats de febre, cansament, dolor muscular i articular (síndrome pseudogripal). Si vostè presenta aquests signes i símptomes cal que aturi ràpidament el tractament i vagi al seu metge.

Conservació

S'ha de conservar a la nevera (no congelar).

Un cop fora de la nevera, s'ha d'utilitzar abans de 7 dies.

Abans d'utilitzar deixi reposar la xeringa durant 30 minuts a temperatura ambient, o escalfi-la amb la mà tancada durant un minut. **NO** l'escalfi de cap altra forma (microones o aigua calenta).



Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs.

