

## **DARUNAVIR (Prezista®)**

---

### ***Servei de Farmàcia***

Conté el principi actiu Darunavir.

Darunavir és un inhibidor de la proteasa, és a dir, bloqueja un enzim anomenat proteasa que participa en la reproducció del VIH.

En bloquejar aquest enzim el virus no es reproduïx de forma normal i es frena la propagació de la infecció.

En administrar Prezista® en combinació amb altres fàrmacs antiretrovirals, es redueix la quantitat de VIH en sang i es manté a nivells baixos. Prezista® no cura la infecció per VIH ni la SIDA, però sí pot retardar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició d'infeccions i malalties associades a la SIDA.

### ***Com s'ha de prendre?***

Els comprimits s'han de prendre sencers amb un got d'aigua i amb aliments (estómac ple).

### ***Què fer si s'oblida una dosi?***

Prengui-la l'abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que l'oblidada.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

### ***Precaucions***

Si vostè pren Prezista® junt amb:

- Ritonavir (Norvir®) els ha de prendre junts.
- Didanosina (Videx®) ha de prendre la didanosina 2 hores abans o una hora després que Prezista®.

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu **no hormonal** eficaç durant el tractament. Si es quedés embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament.

### ***Presentacions comercials***

Existeixen dues presentacions en el nostre centre:

- Prezista®800 mg
- Prezista®600 mg

### ***Interaccions amb altres medicaments***

Alguns medicaments poden interferir amb l'efecte de Prezista®. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

### ***Efectes secundaris***

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Prezista® trobem:

Cansament, mal de cap, trastorns gastrointestinals (vòmits, diarrea), erupció a la pell, augment dels nivells de colesterol, triglicèrids i glucosa en sang i possible augment de sagnat en pacients hemofílics.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

### ***Conservació***

Mantingui els comprimits en l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

### ***Caducitat***

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs.

### ***Si vol saber més pot consultar...***

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>

