

DARUNAVIR 800 mg / COBICISTAT 150 mg (REZOLSTA®)

Servei de Farmàcia

Conté el principi actiu Darunavir i Cobicistat.

Darunavir és un inhibidor de la proteasa, és a dir, bloqueja un enzim anomenat proteasa que participa en la reproducció del VIH.

En bloquejar aquest enzim el virus no es reproduïx de forma normal i es frena la propagació de la infecció.

El cobicistat potencia els efectes del darunavir al prolongar el seu temps d'acció en l'organisme.

En administrar Rezolsta® en combinació amb altres fàrmacs antiretrovirals, es redueix la quantitat de VIH en sang i es manté a nivells baixos. Rezolsta® no cura la infecció per VIH ni la SIDA, però sí que pot retardar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició d'infeccions i malalties associades a la SIDA.

Com s'ha de prendre?

Els comprimits s'han de prendre sencers amb un got d'aigua i amb aliments (estómac ple).

Què fer si s'oblida una dosi?

Prengui-la l'abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que l'oblidada.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Rezolsta® està contraindicat en pacients amb insuficiència hepàtica greu.

Darunavir conté un grup sulfamida. Utilitzar Rezolsta® amb precaució en pacients amb al·lèrgia a les sulfamides.

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu **no hormonal** eficaç durant el tractament. Si es quedés embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament.

Presentacions comercials

Rezolsta® 800 mg/150 mg comprimits recoberts amb pel·lícula.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Rezolsta. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Rezolsta® trobem:

Mal de cap, trastorns gastrointestinals (vòmits, diarrea), reacció d'hipersensibilitat, anorèxia, augment dels nivells de colesterol, triglicèrids i glucosa en sang i possible augment de sagnat en pacients hemofílics.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Mantingui els comprimits en l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>

