

DOLUTEGRAVIR (TIVICAY®)

Servei de Farmàcia

És un medicament que conté dolutegravir, indicat pel tractament de la infecció per VIH.

Dolutegravir és un inhibidor de la integrasa. Bloqueja un enzim anomenat integrasa, implicat en una fase de la reproducció del VIH. Quan aquest enzim es bloqueja, el virus no es reproduïx normalment, frenant així la propagació de la infecció.

Tivay® en combinació amb altres medicaments antiretrovirals manté la quantitat de VIH en la sang a nivells baixos. No cura la infecció pel VIH ni la SIDA, però sí que pot frenar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició d'infeccions i malalties associades a la SIDA.

Posologia

Tivay® s'administra un comprimit de 50 mg al dia; si està prenent altres medicaments (efavirenz, nevirapina, tipranavir/ritonavir o rifampicina) o presenta resistència als inhibidors de la integrasa la dosi és d'1 comprimit dos cops al dia.

Els comprimits es prenen sencers, no es recomana mastegar, triturar o partir els comprimits.

Administrar amb un got d'aigua. Es poden prendre amb aliments o sense.

En el cas de presentar resistència als inhibidors de la integrasa cal administrar amb aliments.

Què fer si s'oblida de prendre una dosi?

L'ha de prendre l'abans possible sempre que la següent dosi no sigui abans de 4 hores. Si la següent dosi és abans de 4 h, no prendre la dosi oblidada i continuar amb la pauta de dosificació habitual. No dobli mai la dosi.

En cas de qualsevol dubte pregunti al seu metge o farmacèutic.

Precaucions

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Tivay®. No prengui cap medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar abans amb el seu metge o farmacèutic.

Si es queda embarassada durant el tractament, ha d'avisar immediatament al seu metge. Evitar la lactància materna durant el tractament.

Dolutegravir pot provocar mareig, si es troba marejat eviti activitats perilloses com conduir o utilitzar màquines.

Contraindicacions

- Pacients amb hipersensibilitat a Dolutegravir.
- No prendre si està en tractament amb Dofetilina.

Efectes secundaris

Els més freqüents són:

- Diarrea
- Nàusees
- Mal de cap

Consulti al seu metge o farmacèutic si apareixen aquests o altres efectes.

Presentacions

Tivicay® 50 mg comprimits.

Conservació

Mantingui els comprimits a l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>

