

DOLUTEGRAVIR / ABACAVIR/ LAMIVUDINA (TRIUMEQ®)

Servei de Farmàcia

És la combinació de tres fàrmacs: Abacavir (600 mg), Lamivudina (300 mg) i Dolutegravir (50 mg).

Abacavir i Lamivudina són inhibidors de la transcriptasa inversa anàleg dels nucleòsids (ITIAN). Actuen bloquejant l'activitat de la transcriptasa, un enzim produït pel VIH que li permet infectar les cèl·lules de l'organisme i produir més virus.

Dolutegravir és un inhibidor de la integrasa. Bloqueja un enzim anomenat integrasa, implicat en una fase de la reproducció del VIH. Quan aquest enzim es bloqueja, el virus no es reproduïx normalment, frenant així la propagació de la infecció.

Triumeq® manté la quantitat de VIH a la sang a nivells baixos. No cura la infecció pel VIH ni la SIDA, però sí que pot frenar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició d'infeccions i malalties associades a la SIDA.

Posologia

Triumeq® s'administra per a adults o adolescents amb un pes superior a 40 kg, un comprimit per via oral al dia.

Els comprimits es prenen sencers, no es recomana mastegar, triturar o partir els comprimits.

Administrar amb un got d'aigua. Es poden prendre amb aliments o sense.

Què fer si s'oblida de prendre una dosi?

L'ha de prendre l'abans possible sempre que la següent dosi no sigui abans de 4 hores. Si la següent toma és abans de 4 h, no prendre la dosi oblidada i continuar amb la pauta de dosificació habitual. No dobli mai la dosi.

En cas de qualsevol dubte pregunti al seu metge o farmacèutic.

Precaucions

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Triumeq®. No prengui cap medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar abans amb el seu metge o farmacèutic.

Reacció d'hipersensibilitat a Abacavir:

Aquest medicament pot provocar una reacció d'hipersensibilitat o reacció al·lèrgica greu per la seva salut.

Quan apareix, acostuma a fer-ho en les primeres setmanes de tractament i empitjora al continuar-lo. Si es detecta a temps la seva aparició, no cal amoïnar-se.

Consulti al seu metge IMMEDIATAMENT si nota qualsevol dels següents símptomes: febre, erupció cutània, envermelliment i/o picors, nàusees, vòmits, diarrea o dolor abdominal, cansament, malestar general, dificultat per respirar, mal de coll o tos.

Dolutegravir també pot provocar una reacció d'hipersensibilitat.

El seu metge valorarà si aquests símptomes es deuen a la reacció d'hipersensibilitat o a altres causes i si cal suspendre o no el tractament amb Abacavir i Dolutegravir. Si el seu metge suspèn el tractament amb Abacavir i Dolutegravir MAI MÉS el podrà tornar a prendre.

Si es queda embarassada durant el tractament, avisar immediatament al seu metge. Evitar la lactància materna durant el tractament.

Dolutegravir pot provocar mareig, si es troba marejat eviti activitats perilloses com conduir o utilitzar màquines.

Contraindicacions

Pacients amb hipersensibilitat a Abacavir, Lamivudina o Dolutegravir.

No prendre si està en tractament amb Dofetilina.

Triumeq® no està recomanat en pacients amb un aclariment de creatinina <50 ml/min ni en pacients amb insuficiència hepàtica moderada i greu.

Efectes secundaris

Els més freqüents són:

- Hipersensibilitat
- Insomni
- Diarrea, nàusees
- Cansament
- Mal de cap

Consulti al seu metge o farmacèutic si apareixen aquest o altres efectes.

Conservació

Mantingui els comprimits en l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

