

EFAVIRENZ (SUSTIVA®)

Servei de Farmàcia

Conté el principi actiu Efavirenz.

Efavirenz és un inhibidor no nucleòsid de la transcriptasa inversa, és a dir, bloqueja l'activitat d'un enzim anomenat transcriptasa inversa produïda pel VIH que li permet infectar les cèl·lules de l'organisme i produir més virus.

En administrar Sustiva® en combinació amb altres fàrmacs antiretrovirals, es redueix la quantitat de VIH en sang i es manté a nivells baixos. Sustiva® no cura la infecció per VIH ni la SIDA, però sí que pot retardar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició d'infeccions i malalties associades a la SIDA.

Com s'ha de prendre?

Els comprimits s'han de prendre sencers amb un got d'aigua, amb aliments o sense.

Si es pren amb aliments, és preferible que els àpats siguin lleugers i pobres en greixos.

Què fer si s'oblida una dosi?

Prengui-la l'abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que l'oblidada.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Es recomanen mesures anticonceptives eficaces tant en els pacients homes com en dones durant el tractament.

Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament.

Sustiva® pot produir mareig, trastorns de la concentració i/o somnolència. Si presenta aquests símptomes ha d'evitar conduir o utilitzar màquines.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Sustiva® trobem:

- Trastorns del sistema nerviós (sons anormals, ansietat, depressió, insomni, alteració de la concentració, mareig, mal de cap), trastorns gastrointestinals (vòmits, diarrea, nàusees, dolor abdominal), erupció a la pell i pruíja.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Els efectes secundaris poden aparèixer a l'inici del tractament i solen desaparèixer en 2-4 setmanes sense haver-lo d'interrompre.

Els símptomes nerviosos disminueixen al prendre el medicament a l'hora d'anar a dormir.

Si l'endemà al matí es troba marejat, confús o somnolent pot avançar l'administració del fàrmac unes hores.

Presentacions comercials

Presentacions en el nostre centre:

- Sustiva® 600 mg comprimits

Conservació

Mantingui els comprimits en l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>

Forma farmacèutica: COMPRIMIDOS					
Descripción					
Forma	Color	Ranura	Longitud	Inscripciones	Presencia de dibujo
	AMARILLO OSCURO	NO		SUSTIVA N/A	NO