

EFAVIRENZ/EMTRICITABINA/TENOFOVIR EFG

Servei de Farmàcia

És un medicament que conté tres principis actius: efavirenz (600 mg), emtricitabina (200 mg) i disoproxil de tenofovir (245 mg).

Efavirenz és un inhibidor de la transcriptasa inversa no anàleg dels nucleòsids; emtricitabina és un inhibidor de la transcriptasa inversa anàleg dels nucleòsids i el disopropil de tenofovir és un profàrmac del tenofovir, és a dir, que es converteix en el principi actiu tenofovir en l'organisme. El tenofovir és un inhibidor de la transcriptasa inversa anàleg dels nucleòsids. Els tres principis actius bloquegen l'activitat de la transcriptasa inversa, un enzim produït pel VIH que li permet infectar a les cèl·lules i fabricar més virus.

Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir manté la quantitat de VIH a la sang a nivells baixos. No cura la infecció per VIH ni la SIDA, però si pot frenar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició d'infeccions i malalties associades a la SIDA.

Com s'ha de prendre?

Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir s'administra per via oral un comprimit al dia, s'ha d'empassar sencer amb un got d'aigua.

Es recomana prendre Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir amb l'estómac buit en anar a dormir, és a dir, dues hores després d'haver sopat.

Cal prendre el medicament diàriament, a la mateixa hora i no saltar-se cap dosi.

Què fer si s'oblida una dosi?

Prengui-la l'abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que l'oblidada.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Si vomita, no s'ho torni a prendre. En cas de qualsevol dubte, pregunti al seu metge o farmacèutic.

Precaucions

Si té hipersensibilitat a efavirenz, emtricitabina i tenofovir.

En cas d'insuficiència renal moderada a greu i insuficiència hepàtica greu.

En pacients amb depressió i altres quadres psiquiàtrics com psicosi.

En pacients en tractament amb antiepilèptics.

Es recomanen mesures anticonceptives eficaces durant el tractament, NO anticonceptius orals.

Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament.

Presentacions comercials

Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir EFG comprimits.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte d'Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir.

No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

No prendre herba de Sant Joan i suc de taronja durant el tractament amb Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir.

Efectes secundaris

Els més freqüents són: malsons i sons estranys, depressió, ansietat, insomni, alteracions de l'humor, mareig (es deuen a efavirenz i desapareixen a les 2-4 setmanes de tractament), fogots, nàusees i diarrea, erupció a la pell i picors, suors nocturns, cansament i manca d'energia.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Els símptomes nerviosos disminueixen al prendre el medicament a l'hora d'anar a dormir. Si l'endemà al matí es troba marejat, confús o somnolent pot avançar l'administració del fàrmac unes hores.

Conservació

Mantingui els comprimits en l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>

