

ELBASVIR/ GRAZOPREVIR (ZEPATIER®)

Servei de Farmàcia

Què és l'Hepatitis C?

És una inflamació del fetge produïda per la infecció d'un virus.

Per què s'ha de tractar l'Hepatitis C?

Perquè el virus està actiu i si no es tracta, va deteriorant el fetge de manera progressiva i hi ha risc de desenvolupar una cirrosi hepàtica, descompensació hepàtica i risc de càncer de fetge.

Què busquem amb el tractament?

L'objectiu principal és curar la malaltia.

Al tenir el virus controlat es detindrà el deteriorament progressiu del fetge. Amb aquest fet pretenem no només prolongar la seva vida sinó millorar i mantenir la seva qualitat de vida, és a dir, que es trobi bé.

Quin és el tractament?

El tractament de l'Hepatitis C varia depenent del genotip del virus de l'hepatitis C, de si el pacient ha rebut tractament anteriorment i del grau de fibrosi del fetge. En el seu cas, el tractament és l'especialitat Zepatier® que conté dos fàrmacs: Elbasvir i Grazoprevir.

Aquest fàrmac és de Dispensació Hospitalària i l'haurà de recollir a la Farmàcia del seu Hospital.

Com l'ha de prendre?

L'Elbasvir + Grazoprevir (Zepatier®) és un comprimit diari que s'administra amb aliments o sense. Es recomana prendre sencer.

Què fer si s'oblida de prendre una dosi de Zepatier®?

L'ha de prendre tan aviat com sigui possible.

Si s'adona compte en el termini de **16 hores** des del moment en què pren Zepatier® habitualment, s'ha de prendre el comprimit el més aviat possible, i la dosi següent la pren a l'hora habitual. Si s'adona després de 16 hores o més des del moment en què s'ha pres Zepatier® habitualment, esperar i prendre la següent dosi a l'hora habitual.

No dobli mai la dosi.

Si el pacient vomita en menys de 4 hores després de prendre Zepatier® s'ha de prendre un altre comprimit, pot fer-ho fins a 8 h abans de la següent toma. Si vomita després de més de 4 hores de prendre'l, no cal que es prengui un altre comprimit fins al pròxim que tingui programat de forma regular.

Precaucions

Si té hipersensibilitat a elbasvir, grazoprevir o lactosa.

Si el tractament es combina amb Ribavirina, es recomanen mesures anticonceptives eficaces durant el tractament, tant en les pacients tractades, com en les parelles de sexe femení dels pacients masculins.

Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament.

S'han notificat en alguns pacients episodis de cansament, durant el tractament, cal tenir-ho en compte si el pacient ha de conduir o manipular maquinària.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte del seu tractament. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Està contraindicada l'administració concomitant amb inhibidors de la HMG-Co A reductasa, herba de Sant Joan, rifampicina, ciclosporina, carbamazepina, fenitoïna, dabigatran, ketoconazol, bosetan entre d'altres.

Quins són els efectes secundaris més comuns?

Pot provocar:

- Cansament
- Mal de cap

Si es combina amb Ribavirina pot produir anèmia.

Davant qualsevol efecte advers no descrit en aquest document, que cregui que pot estar relacionat amb la medicació, cal comunicar-ho al seu metge.

Es recomana NO prendre alcohol per no augmentar la lesió del fetge.

Recordi:

Prengui el medicament com li ha indicat el seu metge.

El tractament és personal i no l'ha d'utilitzar una altra persona.

Informi al seu metge o farmacèutic si està prenent altres medicaments.

Mantingui el medicament fora l'abast dels nens.

No utilitzi el medicament un cop superada la data de caducitat (darrer dia del mes indicat a l'envàs).

Si vol saber més pot consultar..

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

<http://www.cdc.gov/spanish/az/h.html>

