

ELVITEGRAVIR/ COBICISTAT/ EMTRICITABINA/ TAF (GENVOYA®)

Servei de Farmàcia

És un medicament que conté els principis actius: Elvitegravir 150 mg, Cobicistat 150 mg, Emtricitabina 200 mg i Tenofovir alafenamida fumarat 10 mg indicats pel tractament de la infecció per VIH.

Elvitegravir actua inhibint l'enzim integrasa que participa en el procés de replicació del virus, d'aquesta manera redueixen la capacitat del virus de replicar-se amb normalitat. El cobicistat potencia els efectes de l'elvitegravir al prolongar el seu temps d'acció en l'organisme.

Emtricitabina i Tenofovir són inhibidors de la transcriptasa inversa, anàlegs dels nucleòsids. Els dos principis actius bloquegen l'activitat de la transcriptasa inversa, un enzim produït pel VIH que li permet infectar a les cèl·lules i fabricar més virus.

Genvoya® manté la quantitat de VIH a la sang a nivells baixos. No cura la infecció pel VIH ni la SIDA, però sí pot frenar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició d'infeccions i malalties associades a la SIDA.

Posologia

Genvoya® s'administra un comprimit un cop al dia.

Els comprimits es prenen sencers amb un got d'aigua i després d'un àpat (amb l'estómac ple).

Què fer si s'oblida de prendre una dosi?

L'ha de prendre l'abans possible. Si han passat més de divuit hores, esperi a la següent toma i no dobli mai la dosi.

Si vomita en el termini d'una hora després de prendre Genvoya®, ha de prendre un altre comprimit.

En cas de qualsevol dubte pregunti al seu metge o farmacèutic.

Precaucions

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Genvoya®. No prengui cap medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar abans amb el seu metge o farmacèutic.

Es recomana iniciar el tractament en pacients amb $ClCr \geq 30$ ml/min.

Genvoya® conté lactosa com excipient.

L'ús de Genvoya® s'ha d'acompanyar de mètodes anticonceptius efectius.

Genvoya® únicament s'ha d'utilitzar durant l'embaràs si el benefici potencial justifica el risc potencial.

No utilitzar durant la lactància.

Pot provocar mareig, cal anar amb precaució al conduir i utilitzar màquines.

Contraindicacions

Pacients amb:

- CLCr < 30 ml/min
- Hipersensibilitat a elvitegravir, cobicistat, emtricitabina i/o tenofovir

Efectes secundaris

Els més freqüents són:

- Nàusees
- Fatiga, erupcions cutànies
- Mal de cap, mareig.
- Diarrea, vòmits, dolor abdominal i flatulència
- Malsons

Consulti al seu metge o farmacèutic si apareixen aquests o altres efectes secundaris.

Conservació

Mantingui els comprimits en l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>



Forma farmacèutica: COMPRIMIDOS
Descripción

Forma	Color	Ranura	Longitud	Inscripciones	Presencia de dibujo
	VERDE	NO	19,00mm	GSI 510	NO