

## **ELVITEGRAVIR/ COBICISTAT/ EMTRICITABINA/ TENOFOVIR DISOPROXIL (STRIBILD®)**

---

### ***Servei de Farmàcia***

És un medicament que conté els principis actius: Elvitegravir 150 mg, Cobicistat 150 mg, Emtricitabina 200 mg i Tenofovir disoproxil 245 mg indicats pel tractament de la infecció per VIH.

Elvitegravir actua inhibint l'enzim integrasa que participa en el procés de replicació del virus, d'aquesta manera redueixen la capacitat del virus de replicar-se amb normalitat. El cobicistat potencia els efectes de l'elvitegravir al prolongar el seu temps d'acció en l'organisme.

El disopropil de tenofovir és un profàrmac del tenofovir, és a dir, que es converteix en el principi actiu tenofovir en l'organisme.

Emtricitabina i Tenofovir són inhibidors de la transcriptasa inversa, anàlegs dels nucleòsids. Els dos principis actius bloquegen l'activitat de la transcriptasa inversa, un enzim produït pel VIH que li permet infectar a les cèl·lules i fabricar més virus.

Stribild® manté la quantitat de VIH a la sang a nivells baixos. No cura la infecció per VIH ni la SIDA, però sí que pot frenar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició d'infeccions i malalties associades a la SIDA.

### ***Posologia***

Stribild® s'administra un comprimit un cop al dia.

Els comprimits es prenen sencers amb un got d'aigua i després d'un àpat (amb l'estómac ple).

### ***Què fer si s'oblida de prendre una dosi?***

L'ha de prendre l'abans possible. Si han passat més de divuit hores, esperi a la següent toma i no dobli mai la dosi.

Si vomita en el termini d'una hora després de prendre Stribild®, ha de prendre un altre comprimit.

En cas de qualsevol dubte pregunti al seu metge o farmacèutic.

### ***Precaucions***

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Stribild®. No prengui cap medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar abans amb el seu metge o farmacèutic.

Cal calcular abans d'iniciar el tractament l'aclariment de creatinina i determinar els nivells de glucosa i proteïnes en l'orina dels pacients. Es recomana iniciar el tractament en pacients amb  $ClCr > 90$  ml/min.

Stribild® conté lactosa com excipient.

L'ús de Stribild® s'ha d'acompanyar de mètodes anticonceptius efectius.

Stribild® únicament s'ha d'utilitzar durant l'embaràs si el benefici potencial justifica el risc potencial.

No utilitzar durant la lactància.

Pot provocar mareig, cal anar amb precaució al conduir i utilitzar màquines.

### Contraindicacions

Pacients amb:

- ClCr < 70 ml/min
- Hipersensibilitat a elvitegravir, cobicistat, emtricitabina i/o tenofovir

### Efectes secundaris

Els més freqüents són:

- Astènia, erupcions cutànies
- Disminució de la quantitat de fosfat en sang
- Mal de cap i mareig
- Diarrea, vòmits, nàusees

Consulti al seu metge o farmacèutic si apareixen aquests o altres efectes secundaris.

### Conservació

Mantingui els comprimits a l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

### Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

### Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>



| Forma farmacèutica: COMPRIMIDOS                                                     |       | Descripción |          |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------|---------------|---------------------|
| Forma                                                                               | Color | Ranura      | Longitud | Inscripciones | Presencia de dibujo |
|  | VERDE | NO          | 10,00mm  | GSI<br>1      | NO                  |