

EMTRICITABINA (EMTRIVA®)

Servei de Farmàcia

Conté el principi actiu Emtricitabina.

Emtricitabina és un inhibidor de la transcriptasa inversa, anàleg de nucleòsid (ITIAN), és a dir, bloqueja l'activitat d'un enzim anomenat transcriptasa inversa produïda pel VIH que li permet infectar les cèl·lules de l'organisme i produir més virus.

En administrar Emtriva® en combinació amb altres fàrmacs antiretrovirals, es redueix la quantitat de VIH en sang i es manté a nivells baixos. Emtriva® no cura la infecció per VIH ni la SIDA, però sí pot retardar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició d'infeccions i malalties associades a la SIDA.

Com s'ha de prendre?

Emtriva® s'administra per via oral un cop al dia. En pacients que pesin 33 kg o més la dosi és d'una càpsula (empassar sencera amb un got d'aigua) i en pacients amb problemes per empassar o amb un pes inferior a 33 kg s'administrarà la solució oral en la dosi indicada pel seu metge. Es recomana prendre Emtriva® amb aliments o sense.

Cal prendre el medicament diàriament, a la mateixa hora i no saltar-se cap dosi.

Què fer si s'oblida una dosi?

Prengui-la l'abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que l'oblidada.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

En cas de qualsevol dubte, pregunti al seu metge o farmacèutic

Precaucions

Es recomanen mesures anticonceptives eficaces durant el tractament.

Si es quedés embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament.

Presentacions comercials

Presentacions en el nostre centre:

- Emtriva® 200 mg càpsules
- Emtriva® 10 mg/ml 17ml solució

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte d'Emtriva®.

No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Els efectes secundaris més freqüents d'Emtriva® són: mal de cap, diarrea, insomni, secreció nasal, canvis del color de la pell (especialment a la palma de la mà i la planta del peu), indigestió, dolor a les articulacions, depressió, formigueig en mans, braços, peus i cames i elevació en sang de la concentració de la creatinina.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests símptomes.

Conservació

Mantenir els comprimits a l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>



Forma farmacèutica: CAPSULAS			
Descripción			
Color 1	Color 2	Inscripciones	Presencia de dibujo
AZUL CLARO	BLANCO	200 MG GILEAD	SI

Forma farmacèutica: SOLUCION ORAL			
Descripción			
Color		Sabor	
NARANJA OSCURO			