

EMTRICITABINA / TENOFOVIR DISOPROXIL EFG

Servei de Farmàcia

És un medicament que conté dos principis actius: Emtricitabina 200 mg i Tenofovir disoproxil 245 mg, indicats pel tractament de la infecció per VIH.

El disoproxil de tenofovir és un profàrmac del tenofovir, és a dir, que es converteix en el principi actiu tenofovir en l'organisme.

Emtricitabina i Tenofovir són inhibidors de la transcriptasa inversa, anàlegs dels nucleòsids. Els dos principis actius bloquegen l'activitat de la transcriptasa inversa, un enzim produït pel VIH que li permet infectar a les cèl·lules i fabricar més virus.

Emtricitabina/Tenofovir disoproxil en combinació amb un o més medicaments antiretrovirals manté la quantitat de VIH a la sang a nivells baixos. No cura la infecció per VIH ni la SIDA, però sí que pot frenar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició d'infeccions i malalties associades a la SIDA.

Posologia

Emtricitabina/Tenofovir disoproxil s'administra un comprimit un cop al dia.

Els comprimits es prenen sencers amb un got d'aigua i després d'un àpat (amb l'estómac ple).

Si té dificultat per empassar comprimits, els pot desfer en una mica d'aigua o suc de taronja o raïm i prendre'l ràpidament.

Què fer si s'oblida de prendre una dosi?

L'ha de prendre l'abans possible. Si han passat més de dotze hores, esperi a la següent toma i no dobli mai la dosi.

Si vomita, no s'ho torni a prendre.

En cas de qualsevol dubte, pregunti al seu metge o farmacèutic.

Precaucions

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte d'Emtricitabina/Tenofovir disoproxil. No prengui cap medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar abans amb el seu metge o farmacèutic.

Contraindicacions

Pacients amb:

- Insuficiència renal greu (ClCr < 30 ml/min)
- Hipersensibilitat a emtricitabina i/o tenofovir

Efectes secundaris

Els més freqüents són:

- Al·lèrgia
- Disminució de la quantitat de fosfat en sang,
- Augment de la glucosa (sucre), dels triglicèrids i de la bilirubina en sang
- Insomni, malsons, mal de cap i mareig
- Trastorns gastrointestinals (diarrea, vòmits, nàusees i dolor abdominal)
- Trastorns de la pell (erupcions, picor, hiperpigmentació)

Consulti al seu metge o farmacèutic si apareixen aquest o altres efectes secundaris.

Conservació

Mantingui els comprimits en l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>

