

ESTAVUDINA (ZERIT®)

Servei de Farmàcia

Conté el principi actiu Estavudina.

Estavudina és un inhibidor de la transcriptasa inversa, anàleg del nucleòsid (ITIAN), és a dir, bloqueja l'activitat d'un enzim anomenat transcriptasa inversa produïda pel VIH que li permet infectar les cèl·lules de l'organisme i produir més virus.

En administrar Zerit® en combinació amb altres fàrmacs antiretrovirals, es redueix la quantitat de VIH en sang i es manté a nivells baixos. Zerit® no cura la infecció per VIH ni la SIDA, però sí que pot retardar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició d'infeccions i malalties associades a la SIDA.

Com s'ha de prendre?

Les càpsules s'han de prendre senceres i amb l'estómac buit, una hora abans o dues hores després dels àpats.

Si no és possible empassar les càpsules, es poden obrir i barrejar el seu contingut amb algun aliment.

Què fer si s'oblida una dosi?

Prengui-la l'abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que l'oblidada.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Es recomanen mesures anticonceptives eficaces durant el tractament.

Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament.

Presentacions comercials

Presentacions en el nostre centre:

- Zerit® 30 mg càpsules
- Zerit® 40 mg càpsules

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Zerit®.

No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Zerit® trobem:

Neuropatia perifèrica (formigueig, rigidesa i dolor en mans i peus), diarrea, nàusees, dolor abdominal, dispèpsia, cansament, lipodistròfia, mareig, insomni, pensaments estranys, somnolència, depressió, erupció cutània, picors.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests símptomes.

Conservació

Mantingui els comprimits a l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>

Forma farmacéutica: CAPSULAS			
Descripción			
Color 1	Color 2	Inscripciones	Presencia de dibujo
NARANJA CLARO	NARANJA OSCURO	BMS 1966 30	NO