

EVOLOCUMAB (REPATHA®)

Servei de Farmàcia


Repatha® conté el principi actiu Evolocumab.

Evolocumab és un agent biològic que actua reduint els nivells de colesterol “dolent”, un tipus de greix que es troba a la sang. Sempre ha d’anar acompanyat de la dieta recomanada pel seu metge.

Com s’ha de prendre?

Repatha® s’administra per via subcutània (sota la pell) en l’abdomen, la cuixa i la part superior del braç. No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau o estigui dura.

La dosi recomanada de Repatha® és de 140 mg cada dues setmanes o 420 mg un cop al mes. El seu metge li indicarà quina és la seva pauta.



Triï un dia de la setmana i administri Repatha® el mateix dia a la mateixa hora, una setmana si i una setmana no, o en el cas d’un cop al mes administri les tres plomes de forma consecutiva en un interval de 30 minuts.

Repatha® es conserva en el frigorífic. Tregui'l del frigorífic, 30 minuts abans d’administrar.

Què fer si s’oblida una dosi?

Administri-la l’abans possible.

La dosi següent s’administrarà el mateix dia que estava previst inicialment, com si no s’hagués oblidat.

No prengui mai una dosi doble per compensar l’oblit.

Precaucions

Utilitzar amb precaució en pacients amb insuficiència renal greu i/o insuficiència hepàtica greu. Fer seguiment en pacients amb insuficiència hepàtica moderada.

No es recomana utilitzar Repatha® durant l’embaràs, i es desconeix si s’excreta per la llet materna.

Es desconeix si Repatha® pot influir en la capacitat de conduir i utilitzar màquines.

Presentacions comercials

Presentacions al nostre centre:

- Repatha® 140 mg ploma.

La solució és entre transparent i opalescent, entre incolora i groguenca i està pràcticament lliure de partícules.

La caputxa de l’agulla de la ploma precarregada està fabricada amb cautxú natural (un derivat del làtex).

Interaccions amb altres medicaments

No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Repatha® trobem:

- Risc augmentat de patir infeccions com la grip, nasofaringitis i infeccions del tracte respiratori superior.
- Inflamació, dolor, envermelliment, pruija en el lloc d'injecció.
- Erupció cutània.
- Nàusees.
- Mal d'esquena, artràlgia.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Conservi a la nevera (entre 2 i 8°C). No congelar.

Un cop fora del frigorífic Repatha® es pot conservar a temperatura ambient (fins 25°C) a l'envàs original i utilitzar abans d'un mes.

Protegir de la llum.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

