

FAMPRIDINA (FAMPYRA®)

Servei de Farmàcia

Fampyra® conté el principi actiu fampridina (4-aminopiridina, 4-AP, dalfampridina).

Fampridina està indicat com a tractament per a millorar la marxa en pacients amb esclerosi múltiple.

Com s'ha de prendre?

Fampyra® s'administra per via oral. Els comprimits s'han de prendre sencers, no es poden partir, triturar, dissoldre o mastegar.

La dosi recomanada és d'1 comprimit cada 12 hores (1 comprimit al matí i un comprimit a la nit).

Els comprimits s'han de prendre sense aliments, fora dels àpats.

Cal prendre la dosi exacta que li ha prescrit el seu metge.

Què fer si s'oblida una dosi?

Si s'ha oblidat de prendre una dosi, no intenti compensar-la.

La dosi següent s'administrarà a l'hora que tenia previst, com si no s'hagués oblidat.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu durant el tractament.

Si es quedés embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge.

Es desconeix si la Fampridina es pot excretar per la llet materna. Abans d'iniciar la lactància materna cal consultar-ho amb el seu metge.

Fampridina està contraindicat en pacients amb historial de convulsions o amb alteracions renals. Si ha patit algun d'aquests problemes, informi al seu metge abans d'iniciar el tractament.

Fampyra® pot provocar mareig, si es troba marejat eviti activitats perilloses com conduir o utilitzar màquines.

Presentacions comercials

Presentacions en el nostre centre:

- Fampyra® 10 mg comprimit d'alliberació prolongada.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Fampyra®. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Fampyra® trobem:

- Risc augmentat de patir infeccions, especialment de les vies urinàries.
- Insomni, mareig, debilitat, problemes de l'equilibri.
- Trastorns gastrointestinals: nàusees, estrenyiment i indigestió.
- Mal de coll, irritació de les vies aèries, mal de cap i d'esquena.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos o qualsevol altre no descrit.

Conservació

Conservi a temperatura ambient (per sota de 30°C) en un lloc fresc i sec.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

