

FINGOLIMOD (GILENYA®)

Servei de Farmàcia

És un medicament que conté el principi actiu fingolimod i s'utilitza per tractar l'Esclerosi Múltiple Remitent Recurrent en pacients adults que no responen al tractament amb interferó o en pacients que desenvolupen ràpidament Esclerosi Múltiple greu.

L'Esclerosi Múltiple és una malaltia crònica que afecta al sistema nerviós central. En l'Esclerosi Múltiple el sistema immunitari (les defenses de l'organisme) destrueix la coberta protectora (mielina) que recobreix els nervis del sistema nerviós central, aquest fet pot retardar o interrompre la transmissió dels senyals que passen a través de les cèl·lules nervioses i donar lloc als símptomes de l'Esclerosi Múltiple.

L'Esclerosi Múltiple es caracteritza per atacs repetitius de símptomes del sistema nerviós que són un reflex de la inflamació que té lloc en el sistema nerviós central. A aquests atacs se'ls anomena brots.

Els símptomes dels brots varien d'un pacient a un altre, però generalment consisteixen en: dificultat per caminar, pèrdua de sensibilitat o formigueig, problemes de visió i trastorns en l'equilibri.

Gilenya està indicat en monoteràpia com a tractament modificador del curs de la malaltia. No cura la malaltia, però ajuda a reduir la lesió de les cèl·lules nervioses al dificultar que el sistema immunitari ataqüi al sistema nerviós central. Al deixar de prendre el medicament, augmenten les defenses i ja no tenim l'efecte terapèutic.

Posologia

Gilenya s'administra per via oral una càpsula al dia de 0,5 mg amb aliments o sense, s'ha d'empassar sencera amb un got d'aigua.

Cal prendre el medicament diàriament, a la mateixa hora i no saltar-se cap dosi. No deixi de prendre Gilenya sense abans comentar-li al seu metge.

Què fer si s'oblida de prendre una dosi?

En el cas que s'oblidi una dosi ha de continuar amb la següent dosi tal com ho te prescrit. No prengui una dosi doble per compensar. En cas de qualsevol dubte, pregunti al seu metge o farmacèutic.

Precaucions

No hi ha estudis de tractament en pacients de 65 anys o més ni en menors de 18 anys.

A l'inici del tractament Gilenya pot produir bradiarítmia, disminució transitòria del ritme cardíac, aquest fet pot fer que se senti marejat o cansat, que sigui conscient dels batecs del seu cor o que baixi la tensió arterial.

Per controlar aquest fet, el primer cop que prengui Gilenya haurà d'estar durant sis hores sota control mèdic. En el cas que es suspengui la medicació durant un període superior a dues setmanes, al reiniciar el tractament s'haurà de tornar a fer sota control mèdic.

Si durant el tractament amb Gilenya té febre o símptomes semblants a la grip informi al seu metge ràpidament. Evitar l'embaràs durant el tractament i fins dos mesos després de finalitzat. Verificar abans d'iniciar el tractament que no està embarassada.

Evitar la lactància materna si està prenent Gilenya.

En pacients diabètics pot augmentar el risc d'edema macular.

Informi al seu metge si: pren medicaments pel batec cardíac, si té un ritme cardíac lent o irregular, si té o ha tingut problemes de cor, si té pensat vacunar-se o no ha tingut la varicel·la.

Efectes secundaris

Els efectes secundaris més freqüents de Gilenya són: infeccions per virus influenza (grip), mal de cap, tos, diarrea, mal d'esquena i increment dels enzims hepàtics.

Interaccions

No administrar Gilenya si pren tractament antineoplàsic, immunosupressor o immunomoduladors.

Gilenya pot interaccionar amb: Ketoconazol, inhibidors de la proteasa, antifúngics azòlics, claritromicina i telitromicina.

Conservació

Mantingui els comprimits a l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar

<http://www.sen.es/publico-pacientes/video-informativo/114-videos/434-e-multiple>

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

