

GLECAPREVIR/ PIBRENTASVIR (MAVIRET®)

Servei de Farmàcia

Què és l'Hepatitis C?

És una inflamació del fetge produïda per la infecció d'un virus.

Per què s'ha de tractar l'Hepatitis C?

Perquè el virus està actiu, i si no es tracta, va deteriorant el fetge de manera progressiva i hi ha risc de desenvolupar una cirrosi hepàtica, descompensació hepàtica i risc de càncer de fetge.

Què busquem amb el tractament?

L'objectiu principal és curar la malaltia.

Al tenir el virus controlat es detindrà el deteriorament progressiu del fetge. Amb aquest fet pretenem no només prolongar la seva vida sinó millorar i mantenir la seva qualitat de vida, és a dir, que es trobi bé.

Quin és el tractament?

El tractament de l'Hepatitis C varia depenent del genotip del virus de l'hepatitis C, de si el pacient ha rebut tractament anteriorment i del grau de fibrosi del fetge. En el seu cas, el tractament és la combinació de dos fàrmacs: Glecaprevir/Pibrentasvir (Maviret®).

Aquest medicament és de Dispensació Hospitalària i els haurà de recollir a la Farmàcia del seu Hospital.

Com l'ha de prendre?

Glecaprevir/Pibrentasvir (Maviret®) s'han de prendre tres comprimit junts diaris que s'administren amb aliments.

Prendre sencer, no partir, dissoldre o mastegar.

Es recomana que begui abundants líquids durant el tractament.

Què fer si s'oblida de prendre una dosi de Maviret®?

L'ha de prendre tan aviat com sigui possible.

Si s'adona durant les primeres **18 hores** des del moment en què ha pres Maviret®, haurà de prendre els 3 comprimits com més aviat millor i la dosi següent la prendrà a l'hora habitual.

Si s'adona després de 18 hores o més, esperar i prendre la següent dosi a l'hora habitual.

Si el pacient vomita en menys de 3 hores després de prendre Maviret® s'ha de prendre una dosi. Si vomita 3 hores després de prendre'l, no cal que es prengui una altra dosi fins al pròxim que tingui programat de forma regular.

No dobli mai la dosi.

Precaucions

Si té hipersensibilitat a Glecaprevir, Pibrentasvir o lactosa.

En cas d'insuficiència hepàtica moderada i greu.

Es recomanen mesures anticonceptives eficaces durant el tractament a les dones en edat fèrtil o a les seves parelles de sexe masculí durant el tractament i durant els 6 mesos posteriors a la finalització del tractament. Està contraindicat l'ús d'etinilestradiol.

Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte del seu tractament. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic (Herba de sant Joan) o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Quins són els efectes secundaris més comuns?

Pot provocar:

- Cansament, astènia
- Nàusees
- Diarrea
- Cefalea

Davant qualsevol efecte advers no descrit en aquest document, que cregui que pot estar relacionat amb la medicació, cal comunicar-ho al seu metge.

Es recomana No prendre alcohol, per no augmentar la lesió del fetge

Com s'han de conservar?

Maviret® es conserven a temperatura ambient.

Recordi:

Prengui el medicament com li ha indicat el seu metge.

El tractament és personal i no l'ha d'utilitzar una altra persona.

Informi al seu metge o farmacèutic si està prenent altres medicaments.

Mantingui el medicament fora l'abast dels nens.

No utilitzi el medicament un cop superada la data de caducitat (darrer dia del mes indicat a l'envàs).



Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

<http://www.cdc.gov/spanish/az/h.html>

