

GOLIMUMAB (SIMPONI®)

Servei de Farmàcia

Simponi® conté el principi actiu Golimumab.

Golimumab és un agent biològic que actua reduint el dolor i la inflamació associat a certes malalties autoimmunes com artritis reumatoide, espondilitis anquilosant i artritis psoriàsica.

Com s'ha de prendre?

Simponi® s'administra per via subcutània (sota la pell). No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau o estigui dura.

Simponi® s'administra un cop al mes. Triï un dia i administri sempre Simponi® el mateix dia de cada mes i a la mateixa hora. No s'ha d'administrar al braç.

Simponi® es conserva en el frigorífic. Tregui'l del frigorífic, 30 minuts abans d'administrar. No agitar.





El tap de la ploma s'ha de treure únicament en el moment de l'administració. Un cop retirat no torni a posar-lo fins després de l'administració, per evitar que es doblegui o malmeti.

Subjecti la ploma amb una mà per sobre del botó blau, assegurant-se que no el pressiona fins que estigui la ploma ben col·locada, en angle recte de 90°, amb la base de color verd de seguretat ben plana a sobre de la pell. No pessigui la pell per evitar lesions.

Un cop ben col·locada, empenyi la ploma cap avall fins que la base de seguretat quedi dins de la coberta transparent, quedant fora només la part més ampla.

Amb l'altra mà, pressioni el botó blau, que romandrà pressionat sol sense necessitat de continuar pressionant. Cal mantenir la ploma en aquesta posició fins a escoltar un segon clic (uns 8 segons). Si no el sent, podrà retirar-lo passats uns 15 segons.



Què fer si s'oblida una dosi?

Administri-la el més aviat possible:

- Si la dosi s'ha demorat menys de dues setmanes, la dosi següent s'administrarà el mateix dia que estava previst inicialment, com si no s'hagués oblidat.
- Si la dosi s'ha demorat més de dues setmanes, la següent dosi serà després d'un mes i establirà un nou calendari.

No administri mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu durant el tractament i fins sis mesos després de finalitzar el tractament.

Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament i fins sis mesos després de finalitzar el tractament.

El tap de l'agulla de la xeringa conté làtex, no el manipuli si té al·lèrgia al làtex.

Simponi® conté sorbitol com excipient, informi al seu metge o farmacèutic si té intolerància a la fructosa.

Algunes vacunes estan contraindicades durant el tractament amb Simponi®.

Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans de vacunar-se.

Si té una infecció activa com la grip, angines, úlceres en una cama... no ha de començar el tractament amb Simponi®.

Presentacions comercials

Presentacions en el nostre centre:

- Simponi 50 mg ploma
- Simponi 100 mg ploma

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Simponi®. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Simponi® trobem:

Risc augmentat de patir infeccions (que es poden manifestar amb febre, cansament, dificultat per respirar, pèrdua de pes, malestar general, problemes dentals, tos, molèsties en orinar); inflamació, dolor, envermelliment, prujia en el lloc d'injecció; reacció al·lèrgica (erupció cutània, dificultat per respirar, inflamació de la cara, mans o peus); trastorns gastrointestinals com estrenyiment, dispèpsia, dolor abdominal i gastrointestinal i alteracions hepàtiques com ulls i pell grogosa, orina color marró fosc, dolor abdominal costat dret, febre, sensació de mareig, vòmits i molt cansament.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Conservi en nevera (entre 2 i 8°C).

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

