

INTERFERÓ β 1a (AVONEX®)

Servei de Farmàcia

Avonex® conté el principi actiu Interferó β 1a. L'interferó β 1a és una proteïna que elabora el nostre propi organisme per protegir-nos d'infeccions i malalties.

S'utilitza per tractar l'Esclerosi Múltiple en primera línia, recidivant i remitent.

L'Esclerosi Múltiple és una malaltia crònica que afecta al sistema nerviós central. En l'Esclerosi Múltiple el sistema immunitari (les defenses de l'organisme) destrueix la coberta protectora (mielina) que recobreix els nervis del sistema nerviós central, aquest fet pot retardar o interrompre la transmissió dels senyals que passen a través de les cèl·lules nervioses i donar lloc als símptomes de l'Esclerosi Múltiple.

L'Esclerosi Múltiple es caracteritza per atacs repetitius de símptomes del sistema nerviós que són un reflex de la inflamació que té lloc en el sistema nerviós central. A aquests atacs se'ls anomena brots.

Els símptomes dels brots varien d'un pacient a un altre, però generalment consisteixen en: dificultat per caminar, pèrdua de sensibilitat o formigueig, problemes de visió i trastorns en l'equilibri.

Avonex® està indicat com a tractament modificador del curs de la malaltia. No cura la malaltia.

Com s'ha de prendre?

Avonex® s'administra per via intramuscular (a la cuixa) un cop per setmana.

Triï un dia fix i administri sempre Avonex® el mateix dia i a la mateixa hora (es recomana a l'hora d'anar a dormir).

No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau o estigui dura. Canviï de lloc d'administració cada cop.

Utilice un lugar de inyección diferente cada semana

La mejor zona es la cara externa en la región superior del músculo del muslo.

Alterne entre el muslo izquierdo y el derecho.

Anote el lugar de inyección de cada semana.



Avonex® es conserva en el frigorífic. Tregui'l del frigorífic 30 minuts abans d'administrar.

Què fer si s'oblida una dosi?

Administri-la l'abans possible. La dosi següent s'administrarà al cap d'una setmana. No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

No administrar si té al·lèrgia a interferó o albúmina, si té epilèpsia no controlada o depressió severa.

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu durant el tractament.

Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament.

Presentacions comercials

Presentacions en el nostre centre:

Avonex® 30 mcg 4 plomes precarregades.



Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte d'Avonex®. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Els efectes secundaris més comuns són:

- Síntomes pseudogripals com mal de cap, febre, calfreds, sudoració, dolors musculars i dolors en general. Són freqüents al començament del tractament i disminueixen al llarg del tractament. A l'inici del tractament prengui analgèsics (paracetamol, ibuprofèn, naproxèn, etc.) 30 minuts abans de la injecció, i repetir cada 6-8 hores els dos dies posteriors a l'administració.
- Síntomes gastrointestinals: nàusees, vòmits, diarrea a l'inici del tractament.
- Neurològics: cefalea, insomni, depressió major, mareig.
- Reacció al·lèrgica com cara, llavis o llengua inflats, dificultat per respirar o erupció.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Conservi a la nevera (entre 2 i 8°C). Si per accident es deixa la ploma fora de la nevera es pot conservar a temperatura ambient (entre 15-30°C) durant una setmana.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>