

IXEKIZUMAB (TALTZ®)

Servei de Farmàcia

Taltz® conté el principi actiu Ixekizumab.

Ixekizumab és un agent biològic indicat per al tractament de la psoriasi.

Com s'ha de prendre?

Taltz® s'administra per via subcutània (sota la pell). No administrar a les zones de la pell on es manifesti psoriasi.

Taltz® s'administra una dosi de 160 mg (2 xeringues) a la setmana 0, 80 mg a les setmanes 2, 4, 6, 8, 10 i 12.

Posteriorment 80 mg cada 4 setmanes.


Taltz® es conserva al frigorífic. Tregui'l del frigorífic, 30 minuts abans d'administrar.

No agitar.

Què fer si s'oblida una dosi?

Consulti al seu metge o farmacèutic.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.



Precaucions

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu durant el tractament i fins 10 setmanes després de finalitzar el tractament.

Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament.

Algunes vacunes estan contraindicades durant el tractament amb Taltz®. Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans de vacunar-se.

Utilitzar amb precaució en pacients amb MII: malaltia de Crohn i colitis ulcerosa.

Presentacions comercials

Presentacions en el nostre centre:

- Taltz® 80 mg ploma

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Taltz® com la warfarina. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.



Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Taltz® trobem:

Risc augmentat de patir infeccions de les vies respiratòries altes, envermelliment i pruíja en el lloc d'injecció.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Conservi a la nevera (entre 2 i 8°C). No congelar.

Conservar a l'envàs original, protegit de la llum.

Taltz® es pot conservar sense frigorífic fins a 5 dies a una temperatura no superior a 30°C.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Hàbits saludables

És important establir una rutina:

- Dutxa diària, preferentment al matí amb un sabó suau en poca quantitat. Esbandir bé. A continuació aplicar el tractament tòpic prescrit pel seu metge i la loció corporal hidratant.
- A la nit, hidratar i tractar les zones afectades.
- A l'hivern: hidratar les mans i protegir-se del fred. La roba més pegada al cos ha de ser de fibres naturals com el cotó.
- A l'estiu, prendre el sol evitant les hores del migdia (de 12 h a 16 h). Aplicar protecció solar resistent a l'aigua 20 minuts abans de l'exposició. Repetir l'aplicació periòdicament.
- L'aigua del mar és beneficiosa pels pacients amb psoriasi, malgrat que la sal pugui produir picor.
- L'aigua de la piscina conté productes que poden irritar i assecar la pell. Dutxar-se després del bany.
- Fer exercici regularment
- Prendre una dieta equilibrada limitant els greixos.

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>