

LAMIVUDINA EFG

Servei de Farmàcia

Lamivudina és un inhibidor de la transcriptasa inversa, anàleg dels nucleòsids (ITIAN). Actua bloquejant l'activitat de la transcriptasa, un enzim produït pel VIH que li permet infectar les cèl·lules de l'organisme i produir més virus. Lamivudina en bloquejar aquest enzim, i administrat en combinació amb altres fàrmacs antiretrovirals, redueix la quantitat de VIH en sang i la manté a nivells baixos. Lamivudina no cura la infecció per VIH ni la SIDA, però sí que pot retardar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició d'infeccions i malalties associades a la SIDA. Lamivudina també s'utilitza per detenir la propagació del virus de l'hepatitis B.

Com s'ha de prendre?

Lamivudina s'administra per via oral un o dos cops al dia.

En pacients majors de 12 anys, la dosi és d'un comprimit de 300 mg al dia o d'un comprimit de 150 mg dos cops al dia (empassar sencer amb un got d'aigua).

En pacients amb problemes per empassar, administrar la solució oral o triturar els comprimits.

En els menors de 12 anys, s'administraran comprimits o solució oral, depenent del pes del pacient, la dosi li indicarà el seu metge.

Es recomana prendre Lamivudina amb aliments o sense. Si té problemes gastrointestinals pot prendre'l amb aliments.

Cal prendre el medicament diàriament, a la mateixa hora i no saltar-se cap dosi.

Què fer si s'oblida una dosi?

Prengui-la l'abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que l'oblidada.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu eficaç durant el tractament. Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament.

Presentacions

- Lamivudina 150 mg comprimits
- Lamivudina 300 mg comprimits

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Lamivudina.

No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Els efectes secundaris més freqüents són:

Mal de cap, diarrea, insomni, calfreds, secreció nasal, tos, malestar a l'estómac, depressió, cansament i mareig.

Informi ràpidament al seu metge si li apareixen erupcions cutànies, té mal d'estómac, vòmits (en nens), trastorns gàstrics (en nens), febre, dolor muscular i formigueig o dolor a les mans o peus.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Mantingui els comprimits a l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

