

## **LEDISPAVIR / SOFOSBUVIR (HARVONI®)**

*Servei de Farmàcia*

### ***Què és l'Hepatitis C?***

És una inflamació del fetge produïda per la infecció d'un virus.

### ***Per què s'ha de tractar l'Hepatitis C?***

Perquè el virus està actiu, i si no es tracta, va deteriorant el fetge de manera progressiva i hi ha risc de desenvolupar una cirrosi hepàtica, descompensació hepàtica i risc de càncer de fetge.

### ***Què busquem amb el tractament?***

L'objectiu principal és curar la malaltia.

Al tenir el virus controlat es detindrà el deteriorament progressiu del fetge. Amb aquest fet pretenem no només prolongar la seva vida sinó millorar i mantenir la seva qualitat de vida, és a dir, que es trobi bé.

### ***Quin és el tractament?***

El tractament de l'Hepatitis C varia depenent del genotip del virus de l'hepatitis C, de si el pacient ha rebut tractament anteriorment i del grau de fibrosi del fetge. En el seu cas, el tractament és l'especialitat Harvoni® que conté dos fàrmacs: Sofosbuvir i Ledipasvir.

Aquest fàrmac és de Dispensació Hospitalària i l'haurà de recollir a la Farmàcia del seu Hospital.

### ***Com l'ha de prendre?***

El Ledipasvir + Sofosbuvir (Harvoni®) és un comprimit diari que s'administra amb aliments o sense. Es recomana prendre'l sencer, ja que presenta sabor amarg.

Es recomana que begui abundants líquids durant el tractament.

### ***Què fer si s'oblida de prendre una dosi de Harvoni®?***

L'ha de prendre tan aviat com sigui possible. Si s'adona en el termini de 18 hores des del moment en què pren Harvoni® habitualment, s'ha de prendre el comprimit com més aviat millor i la dosi següent, l'ha de prendre a l'hora habitual. Si s'adona després de 18 hores o més des del moment en què ha pres Harvoni® habitualment, esperar i prendre la següent dosi a l'hora habitual.

No dobli mai la dosi.

Si vomita en menys de 5 hores després de prendre Harvoni® s'ha de prendre un altre comprimit. Si vomita després de més de 5 hores després de prendre'l, no cal que es prengui un altre comprimit fins al pròxim que tingui programat de forma regular.

### ***Precaucions***

Si té hipersensibilitat a Sofosbuvir, Ledipasvir o lactosa.

En cas d'insuficiència renal greu.

Si el tractament es combina amb Ribavirina es recomanen mesures anticonceptives eficaces durant el tractament, tant en les pacients tractades, com en les parelles de sexe femení dels pacients barons.

Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament.

S'ha notificat en algun pacient episodis de cansament durant el tractament, cal tenir-ho en compte si el pacient ha de conduir o manipular maquinària.

### **Interaccions amb altres medicaments**

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte del seu tractament. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Està contraindicada l'administració concomitant amb rosuvastatina inhibidors de la HMG-Co A reductasa herba de Sant Joan, rifampicina, carbamazepina, fenitoina, rifabutina, rifapentina entre d'altres.

### **Quins són els efectes secundaris més comuns?**

Pot provocar:

- Cansament
- Mal de cap

Si es combina amb Ribavirina pot produir anèmia.

Davant qualsevol efecte advers no descrit en aquest document, que cregui que pot estar relacionat amb la medicació, cal comunicar-ho al seu metge.

Es recomana No prendre alcohol per no augmentar la lesió del fetge.

### **Com s'han de conservar?**

Harvoni® es conserven a temperatura ambient.

### **Recordi:**

Prengui el medicament com li ha indicat el seu metge.

El tractament és personal i no l'ha d'utilitzar una altra persona.

Informi al seu metge o farmacèutic si està prenent altres medicaments.

Mantingui el medicament fora l'abast dels nens.

No utilitzi el medicament un cop superada la data de caducitat (darrer dia del mes indicat a l'envàs).

### **Si vol saber més pot consultar...**

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

<http://www.cdc.gov/spanish/az/h.html>

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Descripción

| Forma                                                                               | Color   | Ranura | Longitud | Inscripciones | Presencia de dibujo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|---------------|---------------------|
|  | NARANJA | NO     | 19,00mm  | GSI<br>7965   | NO                  |