

NEVIRAPINA (VIRAMUNE®)

Servei de Farmàcia

Conté el principi actiu nevirapina. Nevirapina és un inhibidor no nucleòsid de la transcriptasa inversa (ITINAN). Actua bloquejant l'activitat de la transcriptasa inversa, un enzim que el VIH produeix i que li permet infectar cèl·lules en l'organisme i multiplicar-se.

En administrar Viramune® en combinació amb altres fàrmacs antiretrovirals, es redueix la quantitat de VIH a la sang i es manté a nivells baixos. Viramune® no cura la infecció per VIH ni la SIDA, però sí que pot retardar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició d'infeccions i malalties associades a la SIDA.

Com s'ha de prendre?

La dosi recomanada és de 20 ml un cop al dia, durant els primers 14 dies. Després es pren dos cops al dia. Es facilita el seu ús amb la xeringa dispensadora. Es pot prendre amb aliments o sense.

Què fer si s'oblida una dosi?

Prengui-la l'abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que l'oblidada.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Evitar la lactància durant el tractament.

No prengui Viramune® si té:

- Una malaltia hepàtica greu o presenta problemes hepàtics.
- Si pren hipèric o herba de Sant Joan.

Si ha hagut de suspendre Viramune® pels efectes secundaris que li ha produït, no pot tornar a prendre'l.

Si atura el tractament amb Viramune® per un període superior a una setmana informi al seu metge abans de reiniciar el tractament.

Viramune® pot causar fatiga. Si se sent molt cansat eviti realitzar activitats perilloses com conduir o utilitzar màquines.

Presentacions comercials

Presentacions en el nostre centre:

- Viramune® 50mg/5ml suspensió oral

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Viramune®. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Viramune® trobem: mal de cap, diarrea, erupció cutània, nàusees, cansament, dolor abdominal, febre, hepatitis i alteracions hepàtiques en les determinacions analítiques sanguínies.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Mantingui els comprimits a l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

