

ÀCID OBETICÒLIC 5 mg comprimits (OCALIVA®)

Servei de Farmàcia

Ocaliva® té com a principi actiu l'àcid obeticòlic (agonista del receptor X farnesoide) que contribueix a millorar el funcionament del fetge, en reduir la producció i l'acumulació de bilis dins del fetge i també la inflamació.

Aquest medicament s'utilitza per al tractament en adults que pateixen un tipus de malaltia del fetge coneguda com a colangitis biliar primària (també coneguda com a cirrosis biliar primària), sigui per si sol o juntament amb un altre medicament anomenat àcid ursodesoxicòlic.

Com s'ha de prendre?

La dosi recomanada és d'un comprimit de 5 mg un cop al dia, per via oral.

Pot prendre Ocaliva amb aliments o sense. Si pren resines segrestants d'àcids biliars, ha de prendre aquest medicament almenys 4-6 hores abans o almenys 4-6 hores després de la resina.

Què fer si s'oblida una dosi?

Saltis la dosi perduda i prengui la següent dosi seguint l'horari habitual.

La dosi següent s'administrarà el mateix dia que estava previst inicialment, com si no s'hagués oblidat.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Evitar l'ús d'Ocaliva® durant l'embaràs i la lactància.

Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Presentacions comercials

Presentacions en el nostre centre:

- Ocaliva® 5 mg

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte d'Ocaliva®.

No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Ocaliva® trobem:

- Dolor estomacal
- Sensació de cansament

A més, podria experimentar picor a la pell (pruïja) o l'augment de la intensitat d'aquesta picor, mentre s'està prenent el medicament. En general, la picor a la pell és un dels efectes adversos molt freqüent a l'inici del tractament amb Ocaliva i va disminuint la intensitat amb el temps.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos o d'altres.

Conservació

No requereix condicions especials de conservació.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

Forma farmacèutica: COMPRIMIDOS					
Descripción					
Forma	Color	Ranura	Longitud	Inscripciones	Presencia de dibujo
	AMARILLO	NO	8,00mm	INT 5	NO

