

Profilaxi Postexposició VIH

Servei de Farmàcia

La profilaxi postexposició és una mesura secundària per prevenir el VIH quan la prevenció primària ha fallat.

Aquesta consta en l'administració de dos medicaments durant 28 dies consecutius:

- Dolutegravir (Tivicay®) 50 mg comprimits.
- Emtricitabina/Tenofovir disoproxil 200/245 mg comprimits.

Són fàrmacs antiretrovirals indicats pel tractament de la infecció per VIH.

Dolutegravir és un inhibidor de la integrasa. Bloqueja un enzim anomenat integrasa, implicat en una fase de la reproducció del VIH. Quan aquest enzim es bloqueja, el virus no es reproduïx normalment, frenant així la propagació de la infecció.

Emtricitabina i Tenofovir disoproxil són inhibidors de la transcriptasa inversa, anàleg dels nucleòsids. Els dos principis actius bloquegen l'activitat de la transcriptasa inversa, un enzim produït pel VIH que li permet infectar a les cèl·lules i fabricar més virus.

La combinació d'aquests antiretrovirals durant 28 dies i amb un inici, com més aviat millor, després de l'exposició de risc (abans de les primeres 72 hores) ha demostrat ser altament eficaç en la prevenció de la infecció per VIH.

El seguiment mèdic de la profilaxi postexposició VIH es fa a la consulta d'ITS de l'Hospital, en el cas dels homes i a l'ASSIR del Centre d'Atenció Primària en el cas de les dones.

Posologia

Tivicay 50 mg comp® s'administra un comprimit diàriament, a la mateixa hora, amb aliments o sense.

Emtricitabina/Tenofovir disoproxil s'administra un comprimit un cop al dia amb aliments, és a dir, després d'un àpat (amb l'estómac ple).

Els comprimits es prenen sencers, no es recomana mastegar, triturar o partir-los.

Què fer si s'oblida de prendre una dosi?

L'ha de prendre com més aviat millor. Si han passat més de sis hores, esperi a la següent toma i no dobli mai la dosi.

En cas de qualsevol dubte, pregunti al seu metge o farmacèutic.

Precaucions

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Tivicay® i/o Emtricitabina/Tenofovir. No prengui cap medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar abans amb el seu metge o farmacèutic.

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu eficaç durant el tractament. Si es queda embarassada durant el tractament, ha d'avisar immediatament al seu metge.

Contraindicacions

Pacients amb hipersensibilitat a dolutegravir.

Pacients amb:

- Insuficiència renal greu (ClCr < 30 ml/min)
- Hipersensibilitat a emtricitabina i/o tenofovir

Consulti al seu metge o farmacèutic si apareixen aquest o altres efectes.

Presentacions

Tivicay® 50 mg 30 comprimits.

Emtricitabina/Tenofovir disoproxil EFG 30 comprimits.



Efectes secundaris

Tivicay 50®

Els més freqüents són:

- Trastorns gastrointestinals (diarrea, nàusees, vòmits)
- Insomni, canvis d'humor, ansietat (antecedents)
- Elevació transaminases hepàtiques
- Cansament
- Mal de cap

Emtricitabina/Tenofovir disoproxil EFG

Els més freqüents són:

- Al·lèrgia
- Disminució de la quantitat de fosfat en sang
- Augment de la glucosa (sucre), dels triglicèrids i de la bilirubina en sang
- Insomni, malsons, mal de cap i mareig
- Trastorns gastrointestinals (diarrea, vòmits, nàusees i dolor abdominal)
- Trastorns de la pell (erupcions, picor, hiperpigmentació)

Consulti al seu metge o farmacèutic si apareixen aquest o altres efectes secundaris



Conservació

Mantingui els comprimits a l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Cost del tractament (segons COFB 06/2023)

Tivicay 50 mg 30 comprimits recoberts, PVP IVA notificat 656.15€ (21.90€/comprimit).

Emtricitabina/Tenofovir disoproxil 200/245 mg 30 comprimits recoberts, PVP IVA notificat 242.63€ (8.10€/comprimit).