

## **RALTEGRAVIR (ISENTRESS®)**

---

### ***Servei de Farmàcia***

És un medicament que conté raltegravir, indicat pel tractament de la infecció per VIH.

Raltegravir és un inhibidor de la integrasa. Bloqueja un enzim anomenat integrasa, implicat en una fase de la reproducció del VIH. Quan aquest enzim es bloqueja, el virus no es reproduïx normalment, frenant així la propagació de la infecció.

Isentress® en combinació amb altres medicaments antiretrovirals manté la quantitat de VIH en la sang a nivells baixos. No cura la infecció pel VIH ni la SIDA, però sí pot frenar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició d'infeccions i malalties associades a la SIDA.

### ***Posologia***

Isentress 400® s'administra un comprimit dos cops al dia, matí i nit (1-0-1).

Isentress 600® s'administren dos comprimits un cop al dia, matí o nit (2-0-0, o bé 0-0-2).

Els comprimits es prenen sencers, no es recomana mastegar, triturar o partir-los.

Administrar amb un got d'aigua. Es poden prendre amb aliments o sense.

### ***Què fer si s'oblida de prendre una dosi?***

L'ha de prendre l'abans possible. Si han passat més de sis hores, esperi a la següent toma i no dobli mai la dosi.

En cas de qualsevol dubte, pregunti al seu metge o farmacèutic.

### ***Precaucions***

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte d'Isentress®. No prengui cap medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar abans amb el seu metge o farmacèutic.

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu eficaç durant el tractament. Si es queda embarassada durant el tractament, ha d'avisar immediatament al seu metge. Evitar la lactància materna durant el tractament.

Raltegravir pot provocar mareig, si es troba marejat, eviti activitats perilloses com conduir o utilitzar màquines.

### ***Contraindicacions***

Pacients amb hipersensibilitat a raltegravir.

### ***Efectes secundaris***

Els més freqüents són:

- Diarrea
- Nàusees
- Vòmits
- Debilitat
- Cansament
- Mareig
- Mal de cap

Consulti al seu metge o farmacèutic si apareixen aquests o altres efectes.

### ***Presentacions***

- Issentres® 400 mg comprimits
- Issentres® 600 mg comprimits

### ***Conservació***

Mantingui els comprimits a l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

### ***Caducitat***

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

### ***Si vol saber més pot consultar...***

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

