

RILPIVIRINA (EDURANT®)

Servei de Farmàcia

És un medicament que conté el principi actiu: rilpivirina 25 mg.

Rilpivirina és un nou inhibidor de la transcriptasa inversa del VIH-1 no anàleg dels nucleòsids amb estructura diarilpirimidínica.

Actua bloquejant l'activitat de la transcriptasa inversa, un enzim produït pel VIH que li permet infectar a les cèl·lules i fabricar més virus.

Edurant® en combinació amb altres fàrmacs manté la quantitat de VIH a la sang a nivells baixos. No cura la infecció pel VIH ni la SIDA, però sí que pot frenar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició d'infeccions i malalties associades a la SIDA.

Com s'ha de prendre?

Edurant® s'administra per via oral un comprimit al dia amb un àpat, s'ha d'empassar sencer amb un got d'aigua.

Cal prendre el medicament diàriament, a la mateixa hora i no saltar-se cap dosi.

Què fer si s'oblida una dosi?

Prengui-la l'abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que l'oblidada. Prengui'l amb un àpat.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Si vomita dins de les 4 hores següents a l'administració d'Edurant®, s'ho ha de tornar a prendre. Si vomita després de 4 hores de prendre Edurant® no el torni a prendre fins a la següent dosi pautada de forma regular.

En cas de qualsevol dubte pregunti al seu metge o farmacèutic.

Precaucions

Si té hipersensibilitat a rilpivirina.

Es recomanen mesures anticonceptives eficaces durant el tractament.

Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament.

S'han notificat, en algun pacient, episodis de cansament, mareig i somnolència durant el tractament amb Edurant® cal tenir-ho en compte si el pacient ha de conduir o manipular maquinària.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Eviplera®. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

No es recomana el tractament amb Eviplera® i antiepilèptics, inhibidors de la bomba de protons, adefovir, didanosina i herba de Sant Joan.

Efectes secundaris

Els més freqüents són:

- Nàusees, mal de cap, insomni, hiperlipèmia i hiperglicèmia.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Presentacions comercials

Edurant® 25 mg comprimit recobert amb pel·lícula.

Conté lactosa com excipient.

Conservació

Mantingui els comprimits a l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

