

EMTRICITABINA/ RILPIVIRINA/ TENOFOVIR (EVIPLERA®)

Servei de Farmàcia

És un medicament que conté tres principis actius: emtricitabina (200 mg), rilpivirina 25 mg i disoproxil de tenofovir (245 mg).

Rilpivirina és un nou inhibidor de la transcriptasa inversa del VIH-1, no anàleg dels nucleòsids amb estructura diarilpirimidínica; emtricitabina és un inhibidor de la transcriptasa inversa anàleg dels nucleòsids i el disopropil de tenofovir és un profàrmac del tenofovir, és a dir, que es converteix en el principi actiu tenofovir en l'organisme. El tenofovir és un inhibidor de la transcriptasa inversa anàleg dels nucleòsids.

Els tres principis actius bloquegen l'activitat de la transcriptasa inversa, un enzim produït pel VIH que li permet infectar a les cèl·lules i fabricar més virus.

Eviplera® manté la quantitat de VIH a la sang a nivells baixos. No cura la infecció pel VIH ni la SIDA, però sí que pot frenar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició d'infeccions i malalties associades a la SIDA.

Com s'ha de prendre?

Eviplera® s'administra per via oral, un comprimit al dia amb un àpat, s'ha d'empassar sencer amb un got d'aigua. Cal prendre el medicament diàriament, a la mateixa hora i no saltar-se cap dosi.

Què fer si s'oblida una dosi?

Prengui-la l'abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que l'oblidada. Prengui'l amb un àpat.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Si vomita dins de les 4 hores següents a l'administració d'Eviplera®, s'ho ha de tornar a prendre. Si vomita després de 4 hores de prendre Eviplera®, no el torni a prendre fins a la següent dosi pautada de forma regular.

En cas de qualsevol dubte, prengui al seu metge o farmacèutic.

Precaucions

Si té hipersensibilitat a emtricitabina, rilpivirina i tenofovir

En cas d'insuficiència renal lleu i insuficiència hepàtica moderada.

Es recomanen mesures anticonceptives eficaces durant el tractament.

Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament.

S'han notificat en algun pacient episodis de cansament, mareig i somnolència durant el tractament amb Eviplera®, cal tenir-ho en compte si el pacient ha de conduir o manipular maquinària.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte d'Eviplera®. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

No es recomana el tractament amb Eviplera® i antiepilèptics, **inhibidors de la bomba de protons**, adefovir, didanosina i herba de Sant Joan.

Efectes secundaris

Els més freqüents són:

- Nàusees, mareig, mal sons, mal de cap, diarrea, insomni, neutropènia, hiperlipèmia i hiperglicèmia.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Presentacions comercials

Eviplera® 200 mg/25 mg/245 mg comprimit recobert amb pel·lícula.

Conté lactosa com excipient.

Conservació

Mantingui els comprimits a l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>



Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS

Descripción

Forma	Color	Ranura	Longitud	Inscripción	Presencia de dibujo
	ROSA VIOLACEO	NO	19,00mm	GSI	NO