

EMTRICITABINA/ RILPIVIRINA/ TENOFOVIR ALAFENAMIDA (ODEFSEY®)

Servei de Farmàcia

És un medicament que conté tres principis actius: emtricitabina (200 mg), rilpivirina (25 mg) i tenofovir alafenamida (25 mg).

Els tres principis actius bloquegen l'activitat de la transcriptasa inversa, un enzim produït pel VIH que li permet multiplicar-se i infectar a les cèl·lules.

Odefsey® manté la quantitat de VIH a la sang a nivells baixos, això millora el sistema immunitari i disminueix el risc de desenvolupar malalties associades al VIH.

Com s'ha de prendre?

Odefsey® s'administra per via oral, un comprimit al dia **amb un àpat**, s'ha d'empassar **sencer** amb un got d'aigua. Cal prendre el medicament diàriament, a la mateixa hora i no saltar-se cap dosi.

Què fer si s'oblida una dosi?

Si oblida prendre la medicació a la seva hora habitual:

- Si no han passat més de 12 hores, prengui el comprimit oblidat, l'abans possible amb algun aliment.
- Si han passat més de 12 hores, no prengui la dosi oblidada.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Si **vomita** dins de les 4 hores següents a l'administració d'Odefsey®, se l'ha de tornar a prendre. Si vomita després de 4 hores de prendre Odefsey®, no el torni a prendre fins a la següent dosi pauta de forma regular.

En cas de qualsevol dubte, pregunti al seu metge o farmacèutic.

Precaucions

Si té hipersensibilitat a emtricitabina, rilpivirina i tenofovir.

En cas d'insuficiència hepàtica moderada-greu.

Es recomanen mesures anticonceptives eficaces durant el tractament.

Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament.

S'han notificat en alguns pacients episodis de cansament, mareig i somnolència durant el tractament amb Odefsey®, cal tenir-ho en compte si el pacient ha de conduir o manipular maquinària.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte d'Odefsey®.

No es recomana el tractament amb Odefsey® i antiepilèptics (carbamazepina, oxcarbamazepina, fenobarbital i fenitoïna), rifabutina, rifampicina i rifapentina, inhibidors de la bomba de protons (omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol...), dexametasona (excepte com a tractament de dosi única), herba de Sant Joan. Recordi que aquesta llista no és excloent, consulti al seu metge o farmacèutic.

No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Els més freqüents són:

- Nàusees, mareig, mal sons, mal de cap, diarrea, insomni, cansament, alteracions de l'estat d'ànim, flatulències, diarrea, mal d'estómac, neutropènia, hiperlipèmia.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Presentacions comercials

Odefsey® 200 mg/25 mg/25 mg comprimit recobert amb pel·lícula.

Conté lactosa com excipient.

Conservació

Mantingui els comprimits a l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>



Forma farmacèutica: COMPRIMIDOS
Descripción

Forma	Color	Ranura	Longitud	Inscripciones	Presencia de dibujo
	GRIS	NO	15,00mm	GSI 255	NO