

RILUZOL (EFG, comprimits)

Servei de Farmàcia

És un medicament que conté el principi actiu riluzol que actua a nivell del sistema nerviós central i s'utilitza per tractar l'Esclerosi Lateral Amiotròfica.

Posologia

Riluzol s'administra per via oral, normalment un comprimit de 50 mg cada 12 hores amb un got d'aigua.

Riluzol es pot prendre amb aliments o sense, però **MAI amb àpats grassos** perquè disminueixen la seva absorció.

Cal prendre Riluzol diàriament, a la mateixa hora i no saltar-se cap dosi. No deixi de prendre Riluzol sense abans comentar-li al seu metge.

Què fer si s'oblida de prendre una dosi?

En cas que s'oblidi una dosi: NO la prengui, esperi a la pròxima presa i continuï tal com ho té prescrit.

No prengui una dosi doble per compensar. En cas de qualsevol dubte, pregunti al seu metge o farmacèutic.

Precaucions

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu eficaç durant el tractament. En el cas de quedar-se embarassada durant el tractament, informi immediatament al seu metge.

No donar el pit durant el tractament amb Riluzol.

Riluzol pot provocar somnolència, vertigen o mareig, en el cas que vostè presenti aquests efectes, es recomana no conduir vehicles ni utilitzar màquines.

Efectes secundaris

Els efectes secundaris més freqüents de Riluzol són:

- Cansament, sensació de mareig, vertigen, mal de cap, somnolència, diarrea, dolor abdominal i alteració de les proves hepàtiques.

Interaccions

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Riluzol. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Conservació

Mantingui els comprimits a l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.



Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS					
Descripción					
Forma	Color	Ranura	Longitud	Inscripción	Presencia de dibujo
	BLANCO	NO		RPR202	NO