

RISANKIZUMAB (SKYRIZI®)

Servei de Farmàcia

Syrizi® conté el principi actiu Risankizumab, és un anticòs monoclonal indicat en el tractament de l'artritis psoriàsica i la psoriasi amb plaques moderades-greus després d'una resposta inadequada, contraindicació o intolerància a tractaments sistèmics convencionals.


Risankizumab és un anticòs monoclonal humanitzat de tipus immunoglobulina G1 (IgG1) que s'uneix selectivament i amb alta afinitat a la subunitat p19 de la interleucina 23 (IL-23). La IL-23 és una citocina que participa en les respostes inflamatòries i immunitàries. En l'impedir la unió de IL-3 al seu receptor, risankizumab inhibeix la senyalització cel·lular dependent de IL-23 i l'alliberació de citocines proinflamatòries.

Com s'ha d'administrar?

S'administra per via subcutània (sota la pell). No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau, ferida, estigui dura o zones que estiguin afectades per la psoriasi.

La dosi recomanada és de 150 mg (una injecció de 150 mg) en la setmana 0, setmana 4, i a partir d'allà, cada 12 setmanes.

Les injeccions s'han d'administrar en localitzacions anatòmiques diferents (com les cuixes o l'abdomen).



Què fer si s'oblida una dosi?

Administri-la l'abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que l'oblidada.

La dosi següent s'administrarà el mateix dia que estava previst inicialment, com si no s'hagués oblidat.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar anticonceptius eficaços fins 21 setmanes després de la finalització del tractament.

Evitar el seu ús durant l'embaràs i la lactància.

Algunes vacunes estan contraindicades durant el tractament amb Syrizi®. Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans de vacunar-se.

Presentacions comercials

Presentacions al nostre centre:

- Syrizi® 150 mg plomes precarregades

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Syrizi®. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

- Risc augmentat de patir infeccions (que es poden manifestar amb febre, ferides, malestar general, problemes dentals, tos, molèsties a l'orinar, infeccions en vies respiratòries).
- Alteracions en el lloc d'injecció: inflamació, dolor, envermelliment, pruija.
- Cefalea.
- Fatiga.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Conservi a la nevera (entre 2-8°C). Fora de la nevera, es conserva fins a un màxim de 24 hores. Mantenir sempre dins de l'envàs original per protegir de la llum.

No congelar i protegir de la llum.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

