

SARILUMAB (KEVZARA®)

Servei de Farmàcia

Kevzara® conté el principi actiu sarilumab, que és un tipus de proteïna denominada anticòs monoclonal.

S'utilitza per tractar adults amb artritis reumatoide activa de moderada a greu, si el tractament previ no ha funcionat bé o no s'ha tolerat. Es pot utilitzar sol o juntament amb un medicament denominat metotrexat.

Sarilumab pot ajudar a:

- Frenar el dany en les articulacions.
- Millorar la seva capacitat per realitzar activitats diàries.

Kevzara s'uneix al receptor d'una proteïna denominada interleucina-6 (IL-6) i bloqueja la seva acció.


La IL-6 juga un paper principal en els símptomes de l'artritis reumatoide com el dolor, la inflamació de les articulacions, la rigidesa als matins i la fatiga.

Com s'ha d'administrar?

Kevzara® s'administra per via subcutània (sota la pell). No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau o estigui dura.

La dosi recomanada és una injecció de 200 mg cada 2 setmanes. El metge pot ajustar la dosi de la seva medicació, en base als resultats dels anàlisis de sang.

Kevzara® es conserva en el frigorífic. Tregui'l del frigorífic, 30 minuts abans d'administrar.



Què fer si s'oblida una dosi?

Si han passat 3 dies o menys des de la dosi oblidada:

- Injecti la dosi oblidada tan aviat com sigui possible.
- Administrar la seva següent dosi en el dia programat.

Si han passat 4 dies o més, injecti la següent dosi, el següent dia programat.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Embaràs i lactància

Consulti al metge abans d'utilitzar Kevzara si està embarassada o en període de lactància, creu que podria estar-ho o té la intenció de quedar-s'hi.

- No utilitzi Kevzara si està embarassada, a no ser que el seu metge li recomani específicament.
- El seu metge i vostè han de decidir si ha de rebre el tractament Kevzara si està donant el pit.

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar mètodes anticonceptius eficaços durant i fins 3 mesos després del tractament.

Presentacions comercials

- Kevzara 150 mg solució injectable en xeringa precarregada.
- Kevzara 200 mg solució injectable en xeringa precarregada.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interaccionar en l'efecte de Kevzara. Si està utilitzant algun dels següents medicaments, informi el seu metge o farmacèutic abans d'utilitzar Kevzara:

- Estatines (per la reducció del colesterol).
- Anticonceptius orals.
- Teofil·lina (per l'asma).
- Warfarina (per prevenir coàguls de sang).

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents trobem:

- Infeccions en els sinus nasals o a la gola, congestió i degoteig nasal (infecció al tracte respiratori superior).
- Infecció del tracte urinari.
- Herpes oral.
- Recompte baix de plaquetes segons anàlisis de sang.
- Colesterol alt, triglicèrids alts.
- Proves anormals de la funció hepàtica.
- Reaccions al lloc de la injecció (incloent-hi envermelliment i picor).

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Conservi a la nevera (entre 2 i 8°C) i dins l'envàs original per protegir de la llum.

Si per accident la medicació queda fora de la nevera, la medicació és estable 14 dies a temperatura ambient (llençar passats els 14 dies).

Si es congela, no la llenci i consulti al servei de farmàcia de l'hospital.

Mantenir fora de l'abast dels nens

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

