

SOMATROPINA (HUMATROPE®)

Servei de Farmàcia

La somatropina és una hormona del creixement necessària per a un creixement adequat dels diversos teixits corporals i per una adequada distribució de la massa muscular i del teixit gras.


Com s'ha de prendre?

S'administra amb una injecció subcutània (per sota la pell). El metge li indicarà la dosi en funció del seu pes o superfície corporal i la duració del tractament.

S'ha d'administrar a la nit. El lloc d'injecció sol ser: braços, glutis i abdomen (al voltant del melic). S'ha d'alternar el lloc d'injecció per a evitar la lipoatròfia.

Recordi rentar-se les mans i la pell del punt d'injecció i desinfectar amb un cotó impregnat amb alcohol abans de la punció.

Abans de la punció s'ha de fer la reconstitució, on es barreja la pols amb el dissolvent. La solució ha de ser transparent i amb absència de partícules.



Què fer si oblida una dosi?

Si oblida una dosi, administri la següent injecció a l'hora corresponent del dia següent. MAI injecti una dosi doble. Ha de registrar les dosis oblidades i informar al metge.

Precaucions

Si es produeix sagnat en aplicar l'hormona, comprimir la zona durant uns minuts. Consulti amb el metge si es repeteix varis cops.

Abans d'administrar somatropina ha d'informar al metge si pateix hipersensibilitat coneguda a la somatropina, una malaltia crítica, insuficiència respiratòria aguda, hiperglucèmia o diabetis i retinopatia proliferativa. També en el cas que rebi un tractament per hipertiroidisme o hipotiroidisme, insuficiència renal crònica o tractament amb corticoides. Si pateix o es troba en tractament de neoplàsies actives o si ha tingut una lesió intracranial o si està embarassada.

Interaccions

Informi al seu metge o farmacèutic de tota la medicació que pren. Sobretot si pren tractament per la diabetis, trastorns de la glàndula tiroides, hormones sexuals, corticoides, anticonvulsionants i ciclosporina.

Efectes adversos

Envermelliment i picor en la zona d'injecció, lipotatròfia localitzada i formació d'anticossos.

Avisar al metge si presenta reaccions al·lèrgiques com reacció cutània, picor o urticària, inflamació de la cara, llavis o llengua, cefalea intensa o repetida, edemes o rampes severes, problemes visuals, nàusees o vòmits, dolors de maluc o genoll.

Conservació

- Abans de reconstituir:
No congelar. Conservar a la nevera entre 2-8°C. A < 25°C un màxim de 6 mesos.
- Després de reconstituir:
No congelar. Conservar a la nevera entre 2-8°C durant 24 h.

Conservar dins de l'embalatge per protegir de la llum. No utilitzi aquest medicament si conté escuma o no és transparent.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001176.htm>

