

SOMATROPINA (OMNITROPE®)

Servei de Farmàcia

La somatropina o hormona del creixement és necessària per a un adequat creixement dels diversos teixits corporals així com per una adequada distribució de la massa muscular i teixit gras.

Posologia

La somatropina s'ha d'administrar únicament mitjançant injecció subcutània. El seu metge li indicarà la dosi en funció del seu pes o de la superfície corporal i la duració del tractament.


Com s'ha d'aplicar l'hormona del creixement?

S'ha d'administrar **A LA NIT**. El lloc d'injecció és subcutani: braços, glutis i abdomen (al voltant del melic).

Alternar el lloc d'injecció per a evitar la lipoatròfia. Recordar rentar-se les mans i netejar-se la pell en el punt de la injecció amb un cotó impregnat amb alcohol abans d'injectar-se l'hormona.

Presentacions al centre:

- Omnitrope 10 mg/1,5 ml solució injectable.
- Omnitrope 15 mg/1,5 ml solució injectable.



Què fer si...?

- Si s'ha oblidat d'administrar la dosi, posis la següent injecció a l'hora corresponent del dia següent. **No s'injecti una dosi doble.**
- S'han de registrar les dosis oblidades i informar al metge el dia de la visita.
- Pot continuar el tractament si té febre, prendre antibiòtics, vacunes o un altre tipus de medicament. En cas greu, consultar al metge.
- Si es produeix sagnat en aplicar l'hormona, assecar i pressionar la zona durant uns minuts. Consultar el metge si es repeteix varies vegades.
- **Si l'hormona es congela no serveix.**
- Si se'n va de vacances, ha de continuar amb el tractament. Asseguri's de mantenir la medicació a la temperatura indicada en una bossa o caixa de transport amb gel i si viatja a l'estranger, emporti's l'informe mèdic.

Abans d'administrar l'hormona del creixement ha d'avisar el seu metge si...

Pateix d'hipersensibilitat coneguda a la somatropina, una malaltia crítica, insuficiència respiratòria aguda, hiperglicèmia o diabetis, retinopatia proliferativa, si rep tractament per hipertiroïdisme o hipotiroïdisme, insuficiència renal crònica, tractament amb corticoides, si pateix o està amb tractament de neoplàsies actives o si té o ha tingut una lesió intracranial subjacent i està embarassada. No hi ha estudis clínics en dones en període de lactància.

Interaccions

Informi al seu metge o farmacèutic de tota la medicació que està prenent.

Sobretot si té:

- Tractament per la diabetis.
- Trastorns de la glàndula tiroides.
- Hormones sexuals.
- Corticoides.
- Anticonvulsivants.
- Ciclosporina.

Efectes adversos:

En nens:

- Envermelliment, picor o dolor temporal en el lloc d'injecció.
- Dolor articular.

En adults:

- Dolor articular.
- Retenció de líquids.
- Formigueig, adormiment.
- Rigidesa als braços i cames, dolor muscular.
- Dolor o coïssor al braç o a l'avantbraç.

Trucar al metge si...

Presenta reaccions al·lèrgiques com reacció cutània, picor o urticària, inflamació de la cara, llavis o llengua, mal de cap intens o repetit, edema o rampes fortes.

Conservació:

- **Abans del primer ús**
 - No congelar.
 - Conservar a la nevera entre 2°C i 8°C.
- **Després del primer ús**
 - Conservar el cartutx dins la ploma.
 - No congelar.
 - Conservar a la nevera entre 2°C i 8°C un màxim de 28 dies.
 - No utilitzi aquest medicament si la barreja conté escuma o no és transparent.
 - Mantingui el medicament fora de l'abast dels nens.



Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001176.htm>

PROGRAMA CONTIGO

Tel: 93 261 28 89

Horari: dilluns a
divendres de 9h a 18h