

TETRAHIDROCANNABINOL / CANNABINOL (SATIVEX®)

Servei de Farmàcia

Sativex és un medicament que conté tetrahidrocannabinol i cannabinol i s'utilitza per alleujar l'espasticitat associada a l'esclerosi múltiple.

Posologia

És gradual fins a assolir la dosi, cal individualitzar la dosi seguint la pauta d'informació al pacient.

Un cop establerta la dosi diària eficaç, si un dia es troba pitjor, pot augmentar la dosi en una polvorització al dia.

Màxim 12 polvoritzacions/dia.

Administració

Sublingual, mantenir l'envàs en posició vertical i col·locar l'embocadura sota la llengua o cap a la cara interna de la galta.

No efectuar la polvorització prop de la gola ni en el nas.

Variar de lloc d'aplicació.

- Abans de la primera administració:
 - Agitar el vial suaument i retirar el caputxó protector.
 - Col·locar el vial entre els dits polze i cor, i situar l'índex sobre l'embocadura.
 - Purgar el polvoritzador sobre un mocador fins a observar una pols fina.
- Primera administració:
 - Agitar el vial suaument i retirar el caputxó protector.
 - Col·locar el vial entre els dits polze i cor, i situar l'índex sobre l'embocadura.
 - En posició vertical col·locar l'embocadura sota la llengua o cap a la cara interna de la galta, pressionar fermament l'embocadura.
 - Si s'han d'administrar més polvoritzacions deixar passar 15' entre cada polvorització.
 - Tapar amb el caputxó protector.

Què fer si s'oblida de prendre una dosi?

Efectuï una polvorització l'abans possible, no administri dues polvoritzacions per compensar la dosi oblidada.

En cas de qualsevol dubte pregunti al seu metge o farmacèutic.

Precaucions

Conté alcohol.

No es recomana el consum de begudes alcohòliques durant el tractament amb Sativex.

Contraindicacions

Pacients amb:

- Hipersensibilitat a cannabinoides.
- Antecedents personals o familiars d'esquizofrènia o altra malaltia psiquiàtrica greu, excepte depressió associada a la malaltia adjacent.

Efectes secundaris

- Molt freqüents: mareig lleu o moderat durant les primeres setmanes de tractament, cansament.
- Freqüent: anorèxia, augment de la gana, depressió, desorientació, dissociació, amnèsia, alteració de l'equilibri, alteració de l'atenció, disàrtria, disgèusia, letargia, alteració de la memòria, somnolència, visió borrosa, vertigen, estrenyiment, diarrea, boca seca, ulceració de boca, nàusees, vòmits, dolor de boca, astènia, malestar general, caigudes.
- Poc freqüents: faringitis, al·lucinacions, síncope, palpitations, taquicàrdia, hipertensió, irritació de la gola, dolor abdominal, irritació de la zona d'aplicació.

Conservació

Abans d'obrir conservar a la nevera.

Un cop obert conservar fins a 6 setmanes fora de la nevera a T^a < 25°C.

Anotar a l'envàs la data d'obertura.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://www.sen.es/publico-pacientes/video-informativo/114-videos/434-e-multiple>

Recordi

Prengui el medicament com li ha indicat el seu metge.

El tractament és personal i no l'ha d'utilitzar una altra persona.

Informi al seu metge o farmacèutic si està prenent altres medicaments.

Mantingui el medicament fora de l'abast dels nens.

