

TENOFOVIR EFG

Servei de Farmàcia

Què és l'Hepatitis B?

És una inflamació del fetge produïda per la infecció d'un virus.

Per què s'ha de tractar l'Hepatitis B?

Perquè el virus està actiu i si no es tracta, va deteriorant el fetge de manera progressiva i hi ha risc de desenvolupar una cirrosi hepàtica, descompensació hepàtica i risc de càncer de fetge.

Què busquem amb el tractament?

L'objectiu principal és controlar el virus, així es detindrà el deteriorament progressiu del fetge. Amb aquest fet pretenem no només prolongar la seva vida sinó millorar i mantenir la seva qualitat de vida, és a dir, que es trobi bé.

Quin és el tractament?

Es tracta amb els anàlegs de nucleòsids/nucleòtids:

- Tenofovir 245 mg 1 comprimit al dia amb els àpats. Es pot dissoldre en 100 ml d'aigua, suc de taronja o raïm i prendre la suspensió resultant ràpidament.

Quant de temps dura el tractament?

La duració del tractament dependrà de cada pacient, del resultat de les analítiques de seguiment.

Què fer si s'oblida de prendre una dosi?

Cal que la prengui l'abans possible, sempre que no hagin passat més de dotze hores de quan l'havia de prendre. No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

El tractament pot produir efectes adversos?

Tots els medicaments poden produir efectes secundaris.

Tenofovir pot produir diarrea, nàusees, vòmits, flatulència, mareig, mal de cap, cansament i disminució del fosfat a la sang.

Observacions:

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu eficaç durant el tractament. Si es queda embarassada, cal informar ràpidament al seu metge. No donar el pit durant el tractament.

Recordi:

Prengui el medicament com li ha indicat el seu metge.

El tractament és personal i no l'ha d'utilitzar una altra persona.

Informi al seu metge o farmacèutic si està prenent altres medicaments.

Mantingui el medicament fora l'abast dels nens.

No utilitzi el medicament un cop superada la data de caducitat (darrer dia del mes indicat a l'envàs).

Conservació

Mantenir a temperatura ambient (no superior a 30°C) i si és possible dins de l'envàs original.

Hepatitis B i alcohol

És molt important que els pacients amb hepatitis B **No** prenguin alcohol, per no augmentar la lesió del fetge.

IMPORTANT:

Abans de començar el tractament és imprescindible que estigui convençut que és necessari, que entengui per què i com ho ha de fer, i que se senti capaç de portar-lo a terme correctament.

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

<http://www.cdc.gov/spanish/az/h.html>



Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS
Descripción

Forma	Color	Ranura	Longitud	Inscripciones	Presencia de dibujo
	AZUL CLARO	NO	16,80mm	GILEAD 4331 300	SI