

TERIFLUNOMIDA (AUBAGIO®)

Servei de Farmàcia

És un medicament que conté el principi actiu Teriflunomida i s'utilitza per tractar l'Esclerosi Múltiple Remitent Recurrent en pacients adults.

L'Esclerosi Múltiple és una malaltia crònica que afecta al sistema nerviós central. En l'Esclerosi Múltiple el sistema immunitari (les defenses de l'organisme) destrueix la coberta protectora (mielina) que recobreix els nervis del sistema nerviós central, aquest fet pot retardar o interrompre la transmissió dels senyals que passen a través de les cèl·lules nervioses i donar lloc als símptomes de l'Esclerosi Múltiple.

L'Esclerosi Múltiple es caracteritza per atacs repetitius de símptomes del sistema nerviós que són un reflex de la inflamació que té lloc en el sistema nerviós central. A aquests atacs se'ls anomena brots.

Els símptomes dels brots varien d'un pacient a un altre, però generalment consisteixen en: dificultat per caminar, pèrdua de sensibilitat o formigueig, problemes de visió i trastorns en l'equilibri.

Aubagio® està indicat en monoteràpia com a tractament modificador del curs de la malaltia. No cura la malaltia, però ajuda a reduir la lesió de les cèl·lules nervioses al dificultar que el sistema immunitari ataqüi al sistema nerviós central. Al deixar de prendre el medicament augmenten les defenses i ja no tenim l'efecte terapèutic.

Posologia

Aubagio® s'administra per via oral, un comprimit al dia de 14 mg amb aliments o sense, s'ha d'empassar sencer amb un got d'aigua.

Cal prendre el medicament diàriament, a la mateixa hora i no saltar-se cap dosi. No deixi de prendre Aubagio® sense abans comentar-li al seu metge.

Què fer si s'oblida de prendre una dosi?

En el cas que s'oblidi una dosi ha de continuar amb la següent dosi tal com ho té prescrit. No prengui una dosi doble per compensar. En cas de qualsevol dubte preguntar al seu metge o farmacèutic.

Precaucions

No hi ha estudis de tractament en pacients de 65 anys o més ni en menors de 18 anys.

Aubagio® conté lactosa, pacients amb intolerància hereditària a galactosa, insuficiència de lactasa de Lapp o mala absorció de glucosa o galactosa no han de prendre aquest medicament.

No administrar en pacients sotmesos a diàlisi ni en pacients amb insuficiència hepàtica greu.

Descartar l'embaràs abans d'iniciar el tractament. Aubagio® està contraindicat en dones embarassades o en edat fèrtil que no utilitzin mesures anticonceptives fiables.

No administrar durant la lactància, ni en pacients amb estadis d'immunodeficiència greu.

Contraindicada l'administració d'Aubagio® en pacients amb:

- Una infecció activa greu.
- Amb anèmia, leucopènia, neutropènia o trombocitopènia significativa.
- Hipoproteïnèmia greu.

Caldrà controlar la tensió arterial abans i durant el tractament amb Aubagio® així com realitzar controls analítics.

Efectes secundaris

Els efectes secundaris més freqüents d'Aubagio® són: mal de cap, diarrea, nàusees, elevació de l'alanina aminotransferasa i alopecà.

Interaccions

Alguns fàrmacs poden interaccionar amb Aubagio®. Informi al seu metge.

Conservació

Mantingui els comprimits en l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://www.sen.es/publico-pacientes/video-informativo/114-videos/434-e-multiple>

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

